

モスピラン液剤

有効成分：アセタミプリド…2.0%

農林水産省登録 第 20102 号

※印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用害虫名	希 釈 倍 数	使用液量	使 用 時 期 ※	総使用回数※	使 用 方法	
きく	アブラムシ類	500 倍	100 ～ 300L ／ 10a (100～300 mL／ m ²)	発生初期	5 回以内	散布	
ばら、ペチュ ニア、ゆり					本剤：5 回以内 アセタミプリド：5 回以内（但 し、樹幹注入は 1 回以内）		
つつじ類	ツツジグンバイ	250 倍					
つばき類	チャドクガ						
いぬまき	アブラムシ類	500 倍	200 ～ 700L ／ 10a (200～700 mL／ m ²)	収穫 14 日 前まで	3 回以内		
かんきつ							
うめ							
かき	カキノヘタムシガ			収 穫 前 日 まで	本剤：3 回以内 アセタミプリド：4 回以内（但 し、粒剤の定植時までの処理は 1 回以内、散布、くん煙及び定 植後の株元散布は合計 3 回以 内）		
トマト、なす	アブラムシ類	100 ～ 300L ／ 10a (100～300 mL／ m ²)					
きゅうり							
はくさい	アオムシ	250 倍	100 ～ 300L ／	収穫 14 日	本剤：3 回以内	散布	

			10a (100～300 mL／ m ²)	前まで	アセタミプリド：4 回以内（但し、粒剤の定植時までの処理は 1 回以内、散布及び定植後の株元散布は合計 3 回以内）	
キャベツ				収穫 7 日 前まで	本剤：5 回以内 アセタミプリド：6 回以内（但し、粒剤の定植時までの処理は 1 回以内、散布及び定植後の株元散布は合計 5 回以内）	

- （2016 年 3 月 2 日付：きくの変更）
- （2012 年 4 月 25 日付：はくさい、キャベツ 総使用回数変更）
- （2008 年 10 月 1 日付：注意事項の追加）
- （2007 年 10 月 17 日付：なすの変更）