

サンケイエムダイファー水和剤

有効成分：マンネブ…75.0%

農林水産省登録 第 10559 号

※印は収穫物への残留回避のため、本剤及びマンネブを含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	総使用回数※	使 用 方法
ばら きく カーネーション	灰色かび病、炭疽病、 べと病、さび病、	400 ～ 650 倍	100 ～ 300L/10a	発病初期	8 回以内	散布
チューリップ	褐色斑点病	500 倍				
みかん	小黒点病 黒点病	600 ～ 800 倍	200 ～ 700L/10a	収穫 60 日 前まで	2 回以内	
かんきつ (みかんを除く)				収穫 90 日前 まで		
りんご	黒点病	400 ～ 650 倍		収穫 30 日 前まで	1 回	
なし	赤星病			収穫 45 日前	3 回以内	
かき	落葉病 炭疽病			まで	2 回以内	
ばれいしょ	疫病		100 ～ 300L/10a	収穫 14 日 前まで	7 回以内	
とうき	べと病	600 倍	100L/10a	収穫 14 日 前まで	4 回以内	

●散布液には所定量の展着剤（ダインなど）を加えるとより効果的です。

- 2019 年 10 月 9 日付：ばら、きく、カーネーション、チューリップ、みかん、かんきつ（みかんを除く）、りんご、なし、かき、ばれいしょの変更
- 2013 年 10 月 9 日付：みかんの追加
- 2009 年 11 月 18 日付：ばら、きく、カーネーションの変更