

ベニカ S 乳剤

有効成分：ペルメトリン…2.0%

農林水産省登録 第 23112 号

※印は収穫物への残留回避のため、本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期※	総使用回数※	使用方法
樹木類（くちなしを除く）	アブラムシ類、ケムシ類、シャクトリムシ類	400～800倍	200 ～ 700mL/ m ²	発生初期	6回以内	散布
くちなし	アブラムシ類、ケムシ類、シャクトリムシ類					
	アザミウマ類	200倍				
なし	アブラムシ類、シンクイムシ類	200～300倍				
	ハマキムシ類、カメムシ類	200倍				
もも	カメムシ類	200倍				
	アブラムシ類、シンクイムシ類	200～300倍				
	モモハモグリガ	200～400倍				
	ハマキムシ類	300倍				
ネクタリン	カメムシ類	200倍				
	アブラムシ類、シンクイムシ類	200～300倍				
	モモハモグリガ	200～400倍				
うめ	アブラムシ類	300倍	収穫前日まで	2回以内		
かき	カキノヘタムシガ、カメムシ類、チャノキイロアザミウマ	200～300倍	収穫7日前まで	5回以内		
	カキクダアザミウマ	200倍				

キウイフルーツ	キイロマイコガ	200～300倍	100 ～ 300mL/ m ²	収穫 14 日前まで	6 回以内		
	カメムシ類	200 倍					
くり	クリタマバチ	100～200 倍				羽化脱出期(但し、 14 日前まで)	
	クリシギゾウムシ	200 倍					
かんきつ	アブラムシ類、ミカン ハモグリガ	200～400 倍					
	チャノキイロアザミウ マ	200～300 倍					
	カメムシ類	200 倍					
いちじく	アザミウマ類、アブラ ムシ類	200 倍				収穫前日まで	
	イチジクヒトリモドキ	300 倍					
さるなし	キイロマイコガ	200 倍				収穫 7 日前まで	2 回以内
はまなす (果実)	シンクイムシ類	200 倍					
アロニア		300 倍				収穫 14 日前まで	
ハスカップ	アブラムシ類、ハマキ ムシ類					収穫 3 日前まで	
ズッキーニ	フキノメイガ	200～300 倍				収穫 7 日前まで	本剤：3 回以内 ペルメリン：6 回以 内 (但し、乳剤は 3 回以内、粒剤は 3 回以内)
きゅうり	アブラムシ類	300 倍	収穫前日まで	3 回以内			
すいか、メロン、か ぼちゃ				5 回以内			
いちご							
トマト、なす				3 回以内			
ミニトマト				200～300 倍	本剤：3 回以内 ペルメリン：4 回以 内 (但し、株元散		

					布は1回以内、散布及び噴射は合計3回以内)
ごぼう	ヨトウムシ	200倍		収穫7日前まで	5回以内
葉ごぼう	アブラムシ類	300倍		収穫14日前まで	2回以内
だいず	マメシクイガ	300倍		収穫7日前まで	3回以内
ピーマン	タバコガ			収穫前日まで	5回以内
キャベツ	アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、タマナギンウワバ			収穫3日前まで	本剤：5回以内 ペルメリン：5回以内（但し、株元灌注は2回以内）
はくさい	アオムシ、コナガ、ヨトウムシ			収穫7日前まで	5回以内
だいこん	ハイマダラノメイガ	200倍		収穫30日前まで	4回以内
ブロッコリー、カリフラワー	コナガ			収穫3日前まで	5回以内
茎ブロッコリー				収穫7日前まで	3回以内
かぶ	アオムシ			収穫前日まで	本剤：2回以内 ペルメリン：4回以内（但し、散布は2回以内）
レタス				収穫3日前まで	5回以内
非結球レタス	ヨトウムシ	200～300倍		収穫前日まで	本剤：2回以内 ペルメリン：4回以内（但し、乳剤は2回以内、粒剤は2回以内）
しゅんぎく		400倍		収穫21日前まで	2回以内
トレビス	アブラムシ類	300倍		収穫7日前まで	3回以内
にんにく		200～300倍		収穫前日まで	本剤：2回以内 ペルメリン：4回以

					内(但し、乳剤は2回以内、粒剤は2回以内)
たまねぎ	ネギコガ、ハスモンヨトウ	300倍		収穫7日前まで	5回以内
ねぎ	ネギコガ	200倍		収穫前日まで	3回以内
	シロイチモジヨトウ				
アスパラガス	ヨトウムシ			収穫14日前まで	
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、未成熟そらまめ、さやえんどうを除く)	ヨトウムシ類、ウラナミシジミ、フキノメイガ、マメシンクイガ	300倍		収穫7日前まで	
未成熟そらまめ					
えだまめ	ヨトウムシ類、ウラナミシジミ、マメシンクイガ			収穫前日まで	
さやえんどう	ヨトウムシ類、ウラナミシジミ			収穫前日まで	
そらまめ	アブラムシ類		収穫7日前まで		
ほうれんそう			収穫14日前まで	2回以内	
はこべ	オオタバコガ			収穫21日前まで	1回
しそ	ハスモンヨトウ	400倍		収穫前日まで	本剤：2回以内 ペルメリン：4回以内(但し、乳剤は2回以内、粒剤は2回以内)
とうがらし類	タバコガ	200倍		収穫7日前まで	2回以内
とうもろこし	アワノメイガ			収穫14日前まで	4回以内
あずき	アズキノメイガ			収穫7日前まで	3回以内
ばれいしょ	テントウムシダマシ類	200~300倍		収穫14日前まで	4回以内
やまのいも	ヤマノイモコガ			収穫7日前まで	5回以内

さといも	ハスモンヨトウ	200 倍			
さといも (葉柄)					
かんしょ	イモコガ	300 倍			
茶	チャノコカクモンハマキ	200 倍	200 ~ 400mL/ m ²	摘採 14 日前まで	1 回
	チャノホソガ	200~300 倍			
オクラ	ハスモンヨトウ	200 倍	100 ~ 300mL/ m ²	収穫前日まで	3 回以内
非結球あぶらな科 葉菜類 (非結球は くさい、みずな、な ばな類を除く)	アオムシ				
なばな類	アオムシ、コナガ				
みずな	アオムシ				
	ダイコンハマシ				
非結球はくさい	アオムシ	200~400 倍			
つるむらさき	ヨトウムシ	200 倍	収穫 7 日前まで	2 回以内	
ごま	アブラムシ類		収穫 3 日前まで	3 回以内	
食用ゆり			300 倍	収穫前日まで	5 回以内
食用亜麻	ヨトウガ	200 倍	収穫 14 日後まで	2 回以内	
はぼたん	アブラムシ類	200~400 倍	発生初期	6 回以内	
	カメムシ類、ハマキムシ類、ヨトウムシ類、アオムシ	200 倍			
花き類・観葉植 物 (はぼたんを除 く)	アブラムシ類	200~400 倍			
	カメムシ類、ハマキムシ類、ヨトウムシ類	200 倍			

- 2024 年 8 月 28 日付：

適用作物にうめ、はまなす (果実)、アロニア、きゅうり、すいか、メロン、かぼちゃ、いちご、ごぼう、葉ごぼう、かぶ、トレビス、にんにく、えだまめ、ほうれんそう、はこべ、そらまめ、トマト、ミニトマト、なす、ばれいしょ、さといも (葉柄)、食用ゆり、食用亜麻、ごま、しゅんぎく、くちなしを追加。

レタス、リーフレタス、豆類(未成熟、ただし、さやえんどう、未成熟そらまめを除く)、樹木類を変更。

なし、もも、ネクタリン、かき、キウイフルーツ、かんきつ、いちじく、ハスカップ、花き類観葉植物（はぼたんを除く）、はぼたん、樹木類（くちなしを除く）に適用病害虫を追加。

- 2022年8月30日付：なばな類、しそ、非結球あぶらな科葉菜類（しろな、みずな、なばな類を除く）の変更。しろなを非結球はくさいへ統合。
- 2020年7月8日付：非結球あぶらな科葉菜類（しろな、みずな、なばな類を除く）の追加、しろな、みずなの変更。
- 2020年6月18日付：しろな、みずなの変更。
- 2019年5月15日付：キャベツ、ズッキーニ、あずきの変更。
- 2018年3月28日付：しその変更。
- 2014年1月29日付：茎ブロッコリー、ハスカップの追加、樹木類の変更。