

サンケイ クムラス

有効成分：硫黄…79.2%

農林水産省登録 第 21874 号

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	硫黄を含む農薬の総使用回数	
果樹類	ハダニ類	300～400 倍	200～ 700L/10a	-	-	散布	-	
なし	ニセナシサビダニ	300 倍						
りんご	うどんこ病	350～450 倍						
かんきつ	ミカンサビダニ	300～400 倍						
かき	うどんこ病							
うめ	黒星病	400 倍						
もも		300～500 倍						
ぶどう	ブドウ ハモグリダニ	300 倍		収穫後～ 発芽前				
いちご	うどんこ病	500～1000 倍	100～ 300L/10a	-				
野菜類								ハダニ類
麦類	さび病	300～500 倍						60～ 150L/10a
	うどんこ病							
	赤かび病		100～ 300L/10a					
ばら	うどんこ病							
きく	白さび病		200～ 700L/10a					
ホップ [°]	べと病	250～500 倍	200～ 700L/10a					
芝	さび病	300～500 倍	1L/㎡					発病 初期

※きゅうり、まくわうりへの使用はさけてください（薬害）。うり類の内「かぼちゃ、メロン、すいか」には使用可能です。

・2026 年 9 月 9 日付：ぶどうの使用時期の変更