

石原フロンサイド粉剤

有効成分：フルアジナム…0.50%

農林水産省登録 第 17559 号

作物名	適用病害名	使用量★	使用時期	本 剤 の 使 用回数	使用方法	フルアジナムを含む 農薬の使用回数
キャベツ	根こぶ病	15 ～ 20kg/10a		2 回 以 内 (但し、苗 床では 1 回以内、本 圃では 1 回以内)	作条土壌混和	3 回以内(但し、苗床で は 1 回以内、本圃での 土壌混和は 1 回以内、 土壌散布は 1 回以内)
		30 ～ 40kg/10a			全面土壌混和	
	苗立枯病(リ ゾク ト ニ ア 菌)、菌核病	40kg/10a				
はくさい	黄化病、根こ ぶ病	30 ～ 40kg/10a	は種又は 定植前	1 回		2 回以内(但し、土壌混 和は 1 回以内、土壌散 布は 1 回以内)
	根こぶ病	15 ～ 20kg/10a				
カリフラワー、ブロッ コリー		30 ～ 40kg/10a			全面土壌混和	1 回
こまつな	根こぶ病、立 枯病(リゾク トニア菌)	30kg/10a	は種前	全面土壌混和	1 回	
みずな	根こぶ病	30 ～ 40kg/10a	は種又は 定植前			
のざわな		20kg/10a				

なばな類		15 ～ 20kg/10a				作条土壌混和	
		30 ～ 40kg/10a				全面土壌混和	
かんしょ	基腐病	40kg/10a	植付前				3 回以内（但し、植付前は 1 回以内、植付後は 2 回以内）
ばれいしょ	そうか病、粉状そうか病	30 ～ 40kg/10a					6 回以内(但し、種いも浸漬は 1 回以内、植付前の土壌混和及び植付時の植溝散布は合計 1 回以内、植付後の散布は 4 回以内)
レタス、非結球レタス	すそ枯病、ビッグベイン病	30kg/10a					は種又は定植前
たまねぎ	黒腐菌核病、紅色根腐病、べと病	40kg/10a	定植前				7 回以内(但し、全面土壌混和は 1 回以内、苗根部浸漬は 1 回以内、散布は 5 回以内)
ねぎ	白絹病、小菌核腐敗病	15kg/10a	土寄せ時 (但し、収穫 21 日前まで)	2 回以内	株元散布	2 回以内	
にら、にら（花茎）	白絹病	20kg/10a	収穫 30 日前まで	1 回		全面土壌混和	1 回
らっかせい			収穫 45 日前まで				
だいこん	亀裂褐変症 (リゾクトニア菌)	30 ～ 40kg/10a	は種前		全面土壌混和	7 回以内	
チューリップ	葉腐病	40kg/10a	植付前				
	条斑病、微斑						

	モザイク病					
ゆり	茎腐症(リゾ ープス菌によ る)		定植前			3 回以内
てんさい	叢根病	育苗培土 1kg 当り 5 ~10g	は種前		土壌混和	5 回以内(但し、は種前 の土壌混和及び苗床 灌注は合計 1 回以内、 株元散布及び散布は 合計 4 回以内)

★使用量の単位の読み替え方：「kg/10a」=「g/m²」（例 30~40kg/10a=30~40g/m²）

- ・2018 年 10 月 10 日付：キャベツの変更
- ・2021 年 09 月 08 日付：てんさい、非結球あぶらな科葉菜類の変更
- ・2022 年 03 月 17 日付：かんしょの追加
- ・2023 年 06 月 07 日付：かんしょの変更
- ・2023 年 12 月 06 日付：非結球あぶらな科葉菜類の変更。たまねぎ、なばな類の追加
- ・2025 年 11 月 12 日付：なばな類の作条散布の削除