

GF ベンレート水和剤

有効成分：ベノミル…50.0%

農林水産省登録 第 23180 号

※印は収穫物への残留回避のため、本剤及びベノミルを含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数※	使用方法	ベノミルを含む農薬の総使用回数※
樹木類	ごま色斑点病、炭疽病、輪紋葉枯病	2000 倍	200 ～ 700mL/ ㎡	発病初期	-	散布	-
いぬつげ	枝枯病				6 回以内		6 回以内
ばら	うどんこ病、黒星病	2000 ～ 3000 倍	100 ～ 300mL/ ㎡	-			
きく	白さび病	1000 倍					
	褐斑病 黒斑病	2000 ～ 3000 倍					
りんどう	花腐菌核病	3000 倍					
パンジー	根腐病	2000 倍	セルトレイ (60×30cm) 1 冊あたり 500mL	育苗期	2 回以内	灌注	2 回以内
ゼラニウム	黒根病						
チュリップ	球根腐敗病	100 ～ 500 倍	-	植付前又は貯蔵前		15 ～ 30 分間球根浸漬	
		球根重量の 0.1～0.2%				球根粉衣	
		20 倍		植付前		瞬間浸漬	
シクラメン	萎凋病	500 ～	50～100mL/鉢	-	3 回以	灌注	3 回以内

		1000 倍			内				
トルコギキョウ	立枯病（フザリウム菌）	1000 倍	セル成型育苗トレイ 1 箱またはペーパーポット 1 冊 (30×60cm、使用土壌約 4~5L) あたり 500mL	定植前日	1 回		1 回		
しゃくやく、 ぼたん	根黒斑病	20 倍	-	植付前	2 回以内	10 分間 苗基部浸漬	2 回以内		
		500 倍				16 時間 苗基部浸漬			
野菜類、とうもろこし	フザリウム菌による病害	乾燥種子重量の 0.16%			は種前	1 回	種子処理機による 種子粉衣	1 回	
うり類(漬物用)	炭疽病	1000 倍	150 ～ 300mL/ 株	定植前～ 収穫 45 日前まで	2 回以内	灌注	3 回以内(但し、種子粉衣は 1 回以内、 は種後は 2 回以内)		
ズッキーニ	菌核病	3000 倍	100 ～ 300mL/ ㎡	収穫前日まで	3 回以内	散布	4 回以内(但し、種子粉衣は 1 回以内、 は種後は 3 回以内)		
	つる枯病								
かぼちゃ	白斑病	2000 ～ 3000 倍							4 回以内(但し、種子への 処理は 1 回以内、は種後は 3 回以内)
きゅうり	菌核病、灰色かび病、炭疽病、黒星病、つる枯病								
	つる割病	1000 倍	150 ～ 300mL/ 株	定植前～ 定植 1 ヶ月後	2 回以内	土壌灌注	6 回以内(但し、種子への		
ミニトマト	萎凋病								

	菌核病	2000 倍	100 ～ 300mL/ ㎡	収穫前日 まで	3 回以 内	散布	処理は 1 回以 内、土壌灌注 は 2 回以内、 散布は 3 回以 内)
	葉かび病、灰 色かび病	2000 ～ 3000 倍					
トマト	萎凋病	1000 倍	150 ～ 300mL/ 株	定植前～ 定植 1 ヶ 月後	2 回以 内	土壌灌注	6 回以内(但 し、種子への 処理は 1 回以 内、土壌灌注 は 2 回以内、 散布及び常温 煙霧は合計 5 回以内)
	菌核病	2000 倍	100 ～ 300mL/ ㎡	収穫前日 まで	5 回以 内	散布	
	葉かび病、灰 色かび病	2000 ～ 3000 倍					
なす	黒枯病、灰色 かび病	2000 倍	100 ～ 300mL/ ㎡	収穫前日 まで	3 回以 内	散布	4 回以内(但 し、種子粉衣 は 1 回以内、 は種後は 3 回 以内)
	菌核病、褐紋 病、フザリウ ム立枯病						
	半身萎凋病	500 倍	200 ～ 300mL/ 株	定植後～ 収 穫 14 日前まで		土壌灌注	
		1000 倍	400 ～ 600mL/ 株				
ピーマン	うどんこ病、 斑点病、炭疽 病	2000 ～ 3000 倍	100 ～ 300mL/ ㎡	収穫前日 まで		散布	
甘長とうがら し	炭疽病	2000 倍					
オクラ	葉すす病	3000 倍					
レタス	菌核病、灰色 かび病、すそ 枯病	2000 ～ 3000 倍		収 穫 14 日前まで	4 回以 内		5 回以内(但 し、種子粉衣 は 1 回以内、 は種後は 4 回 以内)

すいか	つる枯病、菌核病、炭疽病			収穫前日まで	5 回以内		6 回以内(但し、種子粉衣は 1 回以内、は種後は 5 回以内)
メロン							
カリフラワー	菌核病	2000 倍			3 回以内		4 回以内(但し、種子粉衣は 1 回以内、は種後は 3 回以内)
ブロッコリ		2000 ～ 4000 倍					
	根朽病	2000 倍					
はくさい	白斑病、菌核病	2000 ～ 3000 倍		収穫 7 日前まで	2 回以内		3 回以内(但し、種子粉衣は 1 回以内、は種後は 2 回以内)
	炭疽病						
キャベツ	菌核病、根朽病				6 回以内		7 回以内(但し、種子粉衣は 1 回以内、は種後は 6 回以内)
アスパラガス	茎枯病、株腐病	2000 倍		収穫前日まで	4 回以内		5 回以内(但し、種子粉衣は 1 回以内、は種後は 4 回以内)
ほうれんそう	萎凋病			収穫 21 日前まで	2 回以内		3 回以内(但し、種子粉衣は 1 回以内、は種後は 2 回以内)
パセリ	立枯病	1000 倍	3L/m ²	収穫 45 日前まで	2 回以内	灌注	
みずな	炭疽病、白斑病	4000 倍	100 ～ 300mL/m ²	収穫 14 日前まで	1 回	散布	2 回以内(但し、種子粉衣は 1 回以内、は種後は 5 回以内)

チンゲンサイ				収穫 7 日 前まで			は 1 回以内、 散布は 1 回以 内)
非結球あぶら な科葉菜類 (みずな、チン ゲンサイを除 く)				収 穫 21 日 前 まで			
いちご	炭疽病	500 倍	-	仮植前	1 回	10 ～ 30 分間苗根 部浸漬	9 回以内(但 し、種子粉衣 は 1 回以内、 苗根部浸漬は 1回以内、育苗 期の灌注は 3 回以内、本圃 定植後の灌注 は 1 回以内、 散布は 3 回以 内)
			100mL/株	本圃定植 後(但し 収 穫 30 日 前 ま で)		灌注	
			50～100mL/株	育苗期	3 回 以 内		
	萎黄病		-	仮植前	1 回	1 ～ 3 時 間苗根部 浸漬	
			100mL/株	本圃定植 後(但し 収 穫 30 日 前 ま で)		灌注	
しょうが	いもち病、褐 色しみ病	1000 倍	100 ～ 300mL/ ㎡	収 穫 21 日 前 まで	2 回 以 内	散布	2 回以内
ばれいしょ	黒あざ病	種いも重 の 0.3～ 0.4%	-	植付前	1 回	種いも粉 衣	1 回
かんしょ	つる割病	500 ～ 1000 倍	20～40mL/株	挿苗時		株元灌注	4 回以内(但し、 植付時までの処 理は 1 回以内、
			-	植付前		20 ～ 30	

						分間苗浸漬	植付後は 3 回以内)
	基腐病					30 分間苗浸漬	
	黒斑病					20 ～ 30 分間苗基部浸漬	
	黒斑病	種いも重の 0.4%				種いも粉衣	
	斑点病	1000 倍	100 ～ 300mL/m ²	収穫 7 日前まで	3 回以内	散布	
さといも (葉柄)	乾腐病	種いも重の 0.5%	-	催芽前	1 回	種いも粉衣	1 回
たまねぎ		50 倍	セル成型育苗トレイ 1 箱またはペ - パ - ポ ケ ッ ト 1 冊 (30×60 cm、使用土壌約 5L)あたり 500mL～1L	定植前		灌注	8 回以内 (但し、種子粉衣は 1 回以内、育苗培土混和、灌注または苗根部浸漬は合計 1 回以内、散布は 6 回以内)
		100 倍	セル成型育苗トレイ 1 箱またはペ - パ - ポ ッ ト 1 冊 (30×60 cm、使用土壌約 5L)あたり 500mL				
		1g/1kg 培土		は種前		育苗培土混和	
		20 倍	-	移植直前		3 分間苗根部浸漬	
		灰色腐敗病	2000 ～ 3000 倍	100 ～ 300mL/m ²	収穫前日まで	6 回以内	散布

	灰色かび病、 黒かび病	2000 倍					
らっきょう	乾腐病	500 倍		植付直前		30 分間 種球浸漬	1 回
ねぎ	萎凋病	100 ～ 200 倍	-	定植直前	1 回	5 分間苗 根部浸漬	3 回以内(但 し、種子粉衣 は 1 回以内、 苗根部浸漬及 び灌注は合計 1 回以内、散布 は 1 回以内)
		500 倍				30 分間 苗根部浸 漬	
	小菌核腐敗病	100 ～ 200 倍				5 分間苗 根部浸漬	
		500 倍				30 分間 苗根部浸 漬	
		1000 ～ 2000 倍		収穫 30 日前まで		散布	
		500 倍		定植前	1 回	灌注	
わけぎ	萎凋病		-	植付前	1 回	30 分間 種球浸漬	1 回
みょうが(花 穂)	いもち病	2000 倍	100 ～ 300mL/ m ²	収穫 3 日 前まで	3 回以 内	散布、但 し花穂の 発生期に はマルチフ ィルム被覆 により散布 液が直接 花穂に飛	3 回以内

						散しない 状態で使用 する	
みょうが(茎 葉)				みょうが (花穂)の 収穫 3 日 前まで但 し、花 穂 を収穫し ない場合 にあって は開花期 終了まで		散布	
しそ(花穂)	菌核病	2000 倍	100 ～ 300mL/ m ²	収 穫 21 日前まで	2 回 以 内	散布	3 回 以 内 (但 し、種子粉衣 は 1 回 以 内、 は種後は 2 回 以 内)
ピタヤ	炭腐症		200 ～ 700mL/ m ²	収 穫 14 日前まで			2 回 以 内
せんきゅう	黒色根腐病	160 倍	-	植付前	1 回	30 分 間 種球浸漬	1 回
みつば	菌核病	種子重量 の 0.5%		は種前		種子粉衣	
		500 倍				24 時 間 種子浸漬	
なたね		1000 ～ 2000 倍	100 ～ 300mL/ m ²	収穫 3 日 前まで	2 回 以 内	散布	2 回 以 内
ふき	葉枯病	2000 倍		収穫 7 日			

				前まで			
つるむらさき	紫斑病			収穫 14 日前まで			3 回以内(但し、種子粉衣は 1 回以内、は種後は 2 回以内)
やまのいも	葉渋病、炭疽病			収穫前日まで	3 回以内		4 回以内(但し、植付前までの処理は 1 回以内、植付後は 3 回以内)
えだまめ	菌核病、紫斑病			収穫 30 日前まで			6 回以内(但し、種子粉衣は 1 回以内、灌注は 2 回以内、散布は 3 回以内)
	立枯病	1000 倍	3L/m ²	発芽 14 日後まで	2 回以内	灌注	
さやいんげん	菌核病、角斑病	2000 倍	100 ～ 300mL/m ²	収穫開始 14 日前まで	3 回以内	散布	
	立枯病	1000 倍	3L/m ²	発芽 14 日後まで	2 回以内	灌注	
さやえんどう	菌核病	2000 倍	100 ～ 300mL/m ²	収穫前日まで	3 回以内	散布	
	立枯病	1000 倍	3L/m ²	発芽 14 日後まで	2 回以内	灌注	
豆類(未成熟、ただし、えだまめ、さやいんげん、さやえんどうを除く)	菌核病	2000 倍	100 ～ 300mL/m ²	収穫 30 日前まで	3 回以内	散布	
	立枯病	1000 倍	3L/m ²	発芽 14 日後まで	2 回以内	灌注	
いんげんまめ	菌核病	1000 ～	100 ～ 300mL/	収穫 7 日	4 回以	散布	5 回以内(但

		2000 倍	m ²	前まで	内		し、種子粉衣は 1 回以内、は種後は 4 回以内)
	角斑病	1000 ～ 1500 倍					
えんどうまめ	菌核病、褐紋病	1000 ～ 2000 倍		収穫 14 日前まで			
だいず	菌核病、紫斑病	2000 倍		収穫前日まで			
	黒根腐病	乾燥種子重量の 0.5%	-	は種前	1 回	種子粉衣	
らっかせい	そうか病、茎腐病	2000 倍	100 ～ 300mL/ m ²	収穫 7 日前まで	4 回以内	散布	
	褐斑病、黒渋病	2000 ～ 3000 倍					
豆類(種実、ただし、だいず、いんげんまめ、らっかせい、えんどうまめを除く)	菌核病	1000 ～ 2000 倍		収穫 14 日前まで			
うど		500 倍	-	定植前	1 回	30 分間 種株浸漬	1 回
たらのき	芽枯症	1000 倍		収穫 28 日前まで		駒木瞬間 浸漬	
セネガ	黒根病		3L/m ²	収穫 30 日前まで	3 回以内	灌注	3 回以内
かのこそう	半身萎凋病	160 倍	-	植付前	1 回	30 分間 苗浸漬	1 回
せんぶり	さび病	2000 倍	100 ～ 300mL/ m ²	収穫前日まで	12 回以内 (但し、1 年間に 6 回以内)	散布	12 回以内 (但し、1 年間に 6 回以内)

					回 以 内)		
とりかぶと (薬用)	白絹病	種いも重 量 の 0.4%	-	植付前	1 回	種いも粉 衣	1 回
しゃくやく (薬用)	灰色かび病	1000 倍	100 ～ 300mL/ m ²	収 穫 14 日前まで	10 回以 内 (但 し、1 年 間に 2 回 以 内)	散布	11 回以内(但 し、植付前ま での処理は 1 回以内、植付 後は 10 回以 内(但し、1 年 間に 2 回以 内))
	根黒斑病	20 倍	-	植付前	1 回	10 分間 苗基部浸 漬	
		500 倍				16 時間 苗基部浸 漬	
うめ、あんず	黒星病、すす 斑病	3000 倍	200 ～ 700mL/ m ²	収 穫 7 日 前まで	1 回	散布	1 回
びわ	灰斑病	2000 ～ 3000 倍		収 穫 14 日前まで	3 回以 内		3 回以内
	ごま色斑点病	2000 倍					
くり	実炭疽病	2000 ～ 3000 倍	200 ～ 700mL/ m ²	裂 果 前 (但し、収 穫 14 日 前まで)	4 回以 内	散布	4 回以内
なし	胴枯病、黒星 病、うどんこ 病、輪紋病、心 腐れ症(胴枯 病菌)			収 穫 前 日 まで	4 回以 内		6 回以内(但 し、塗布は 2 回以内、散布 は 4 回以内)
	枝枯病、胴枯 病	20 倍	-	3 月～6 月	2 回以 内	マシン油乳 剤で希釈	

						し塗布	
かき	落葉病、うどんこ病、炭疽病、すす点病	2000 ～ 3000 倍	200 ～ 700mL/ ㎡	収穫前日まで	6 回以内	散布	6 回以内
	疑似炭疽病	2000 倍					
もも	灰星病、黒星病、ホモプシス腐敗病、うどんこ病	2000 ～ 3000 倍		収穫前日まで	3 回以内		3 回以内
おうとう	灰星病、褐色せん孔病	3000 倍		収穫 3 日前まで	2 回以内		2 回以内
ネクタリン	灰星病、黒星病、ホモプシス腐敗病	2000 ～ 3000 倍	3 回以内		3 回以内		
いちじく	株枯病	1000 倍	1～10L/樹	収穫 30 日前まで	5 回以内	株元灌注	5 回以内
キウイフルーツ	果実軟腐病、すす斑病	2000 倍	200 ～ 700mL/ ㎡	収穫 7 日前まで		1 回	
ブル-ペリ-	斑点病、バルデンシア葉枯病	3000 倍		収穫 45 日前まで	3 回以内	散布	4 回以内(但し、休眠期処理は 1 回以内、散布は 3 回以内)
ぶどう	褐斑病、うどんこ病、灰色かび病、晩腐病	2000 ～ 3000 倍		休眠期	1 回		
	黒とう病	2000 倍					
		つる割病、晩腐病	200 ～ 500 倍				
	枝膨病	200 倍					

	芽枯病	2000 倍		収 穫 45 日前まで	3 回 以 内			
みかん	そうか病、 灰色かび病	2000 ～ 3000 倍		収 穫 前 日 ま で	4 回 以 内		4 回以内	
	貯 蔵 病 害 (白 かび病)	4000 倍						
	貯 蔵 病 害 (青 かび病、緑か び病、軸腐病、 炭疽病、黒斑 病)	4000 ～ 6000 倍						
かんきつ(み かんを除く)	貯 蔵 病 害 (白 かび病)	4000 倍			2 回 以 内		2 回以内	
	貯 蔵 病 害 (青 かび病、緑か び病、軸腐病、 炭疽病、黒斑 病)	4000 ～ 6000 倍						
りんご	黒星病、黒点 病、褐斑病、う どんこ病、腐 らん病、すす 点病、すす斑 病、輪紋病	2000 ～ 3000 倍			4 回 以 内		4 回以内	
	モニリア病	2000 倍						
りんご(苗木)	白紋羽病	1000 倍			-		植付直前	-
茶	炭疽病、白星 病、輪斑病、褐 色円星病	2000 ～ 3000 倍	200 ～ 400mL/ ㎡		摘 採 14 日前まで	1 回	散布	1 回
	白紋羽病	1000 ～ 2000 倍	-	-	苗木根部 24 時 間			

						浸漬	
西洋芝(ペントグラス)	葉腐病(ブラウンパッチ)	2000 ～ 3000 倍	2L/m ²	発病初期	6 回以内	散布	6 回以内
こんにゃく	乾腐病	50 ～ 100 倍	-	植付前	1 回	種いもの芽基部に散布	1 回
麦類（小麦を除く）	雪腐病	2000 ～ 3000 倍	60～150mL/m ²	根雪前		散布	
小麦							
桑	胴枯病	1000 倍	100 ～ 300mL/m ²	摘採 9 日前まで			2 回以内
	輪斑病	2000 倍					

- 2018 年 8 月 8 日付：カリフラワ-、トルコギキョウ、やまのいもの追加。ピ-マン、いちご、たまねぎの変更。
- 2019 年 6 月 12 日付：トマト、やまのいもの変更。オクラの追加。
- 2019 年 7 月 10 日付：はくさい、さやいんげんの変更。
- 2020 年 1 月 15 日付：かんしょの変更。
- 2021 年 7 月 21 日付：かんしょ、なす、みかん、かんきつ（みかんを除く）、しゃくやく（薬用）の変更。かぼちゃ、ズッキ-ニの追加。
- 2022 年 5 月 25 日付：かんしょの変更。
- 2023 年 1 月 25 日付：せんぶり、とりかぶと（薬用）、小麦の追加。ブロッコリ-、ズッキ-ニ、うど、しゃくやく（薬用）、麦類（小麦を除く）の変更。
- 2024 年 3 月 14 日付：かんしょの変更。しょうがの追加。
- 2024 年 10 月 2 日付：きゅうり、トマト、ミニトマトの変更。