

## 葉・実を食べる虫退治粒剤

### 家庭園芸用 GF オルトラン粒剤

有効成分：アセフェート…5.0%

農林水産省登録 第 21789 号

※1 印は収穫物への残留回避のため、本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

| 作物名        | 適用害虫名                          | 使用量                                     | 使用時期 | 総使用回数※1 | 使用方法       |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------|---------|------------|
| 花き類・観葉植物※2 | コガネムシ類幼虫、ヨトウムシ類、ネキリムシ類         | 6g/m <sup>2</sup>                       | 発生初期 | 5 回以内   | 株元散布       |
|            | アブラムシ類、アザミウマ類                  | 3~6g/m <sup>2</sup>                     |      |         |            |
| きく         | コガネムシ類幼虫、ヨトウムシ類、ネキリムシ類、ハモグリバエ類 | 6g/m <sup>2</sup>                       |      |         |            |
|            | コガネムシ類幼虫、ヨトウムシ類、ネキリムシ類、コナガ     | 6g/m <sup>2</sup>                       |      |         |            |
| カーネーション    | アブラムシ類、アザミウマ類                  | 3~6g/m <sup>2</sup>                     |      |         |            |
| アリウム       | コガネムシ類幼虫、ヨトウムシ類、ネキリムシ類、ネギコガ    | 6g/m <sup>2</sup>                       |      |         |            |
|            | スジキリヨトウ、シバツトガ                  | 10g/m <sup>2</sup>                      |      |         | 全面散布       |
| 芝          | タマナヤガ                          | 5~10g/m <sup>2</sup>                    |      |         |            |
| きゅうり、なす    | アブラムシ類、アザミウマ類、オンシツコナジラミ        | 3~6g/m <sup>2</sup><br>(1 株あたり<br>1~2g) | 定植時  | 1 回     | 植溝散布又は植穴処理 |
|            | コガネムシ類幼虫、ネキ                    |                                         |      |         | 植穴処理       |

|        |                              |                                      |            |                                                   |            |
|--------|------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------|
| トマト    | リムシ類                         |                                      |            |                                                   |            |
|        | アブラムシ類、オンシツコナジラミ             |                                      |            |                                                   | 植溝散布又は植穴処理 |
| キャベツ   | アブラムシ類                       | 6g/m <sup>2</sup>                    | 育苗期        | 本剤：1回                                             | 散布         |
|        | アザミウマ類                       | 6g/m <sup>2</sup> (1株あたり 2g)         | 定植時        | アセフェート：2回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は1回以内)         | 植穴処理       |
|        | アブラムシ類、アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、ネキリムシ類 | 3~6g/ m <sup>2</sup> (1株 あ た り 1~2g) |            |                                                   |            |
| はくさい   |                              |                                      |            |                                                   |            |
| なばな類*  | アブラムシ類                       | 6g/m <sup>2</sup>                    | は種時        | 1回                                                | 植溝土壌混和     |
| こまつな   | アブラムシ類、ネキリムシ類                |                                      | は種前        |                                                   | 播溝土壌混和     |
| オクラ    | アブラムシ類                       | 6g/m <sup>2</sup> (1株あたり 2g)         | 収穫 14 日前まで |                                                   | 株元散布       |
| ブロッコリー | アオムシ、ヨトウムシ、アザミウマ類、ネキリムシ類     |                                      | 定植時        |                                                   |            |
| だいこん   | アオムシ、コナガ、アブラムシ類              | 3~4g/m <sup>2</sup>                  | は種前        |                                                   | 植溝散布       |
| かぶ     | アブラムシ類、ネキリムシ類                | 4g/m <sup>2</sup>                    | 収穫 21 日前まで |                                                   | 株元散布       |
| ばれいしょ  | アブラムシ類                       | 3~6g/ m <sup>2</sup> (1株 あ た り 1~2g) | 植付時        | 本剤：1回<br>アセフェート：3回以内<br>(但し、植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内) | 植溝散布       |

|                     |         |                     |                |       |         |
|---------------------|---------|---------------------|----------------|-------|---------|
| えだまめ                | ハスモンヨトウ | 3~6g/m <sup>2</sup> | 収穫 21 日前まで     | 3 回以内 | 生育期株元散布 |
| つつじ類                | ツツジグンバイ | 12g/m <sup>2</sup>  | 発生初期           | 5 回以内 | 株元散布    |
| 樹木類（つつじ類、ポインセチアを除く） | ケムシ類    |                     | 生育期（樹高 2 m 以下） |       |         |

\* 「なばな類（茎葉及び花蕾を収穫するもの）」には「太田かぶ」が含まれます。

※2 きく、カーネーション、アリウムを除く

●散布は一ヵ所に集中せず均一に散布してください。