

## アーリーセーフ

有効成分：脂肪酸グリセリド…90.0%

農林水産省登録 第 21767 号

※印は本剤を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	総使用回数※	使用方法				
野菜類(なす、トマト、ミニトマト、しゅんぎくを除く)	アブラムシ類、コナジラミ類	300 倍	150 ~ 500L/10a (150~500 ml/m <sup>2</sup> )	収穫前日まで	-	散布				
	ハダニ類、うどんこ病	300~600 倍								
なす	アブラムシ類、コナジラミ類	300 倍								
	チャノホコリダニ、ハダニ類、うどんこ病	300~600 倍								
トマト、ミニトマト	アブラムシ類、コナジラミ類	300 倍								
	トマトサビダニ、ハダニ類、うどんこ病	300~600 倍								
しゅんぎく	アブラムシ類、コナジラミ類、ハクサイダニ	300 倍								
	ハダニ類、うどんこ病	300~600 倍								
りんご、ぶどう、いちじく	ハダニ類	600 倍					200 ~ 700L/10a (200~700 ml/m <sup>2</sup> )	-	-	-
かんきつ	ミカンキジラミ									
げっきつ										
花き類・観葉植物	ハダニ類、うどんこ病		150 ~ 500L/10a (150~500 ml/m <sup>2</sup> )							
茶	チャノナガサビダニ、カンザワハダニ、チャノホソガ	300~600 倍		摘採前日まで						

- 2022 年 7 月 6 日付：茶の変更
- 2017 年 12 月 20 日付：しゅんぎくの変更
- 2009 年 10 月 7 日付：いちじくの追加

- 2008年8月27日付：トマト、ミニトマトを削除し野菜類に統一し、内容変更。バラを削除し、花き類・観葉植物に統一。かんきつ、げっきつの追加
- 2007年8月15日付：花き類・観葉植物（ばらを除く）、ばらの追加。野菜類（トマト、ミニトマトを除く）、トマト、ミニトマトの変更