

家庭園芸用 GF オルトラン粒剤

有効成分：アセフェート…5.0%

農林水産省登録 第 21789 号

※1 印は収穫物への残留回避のため、本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	総使用回数※1	使用方法
花き類・観葉植物※2	コガネムシ類幼虫、ヨトウムシ類、ネキリムシ類	6g/m ²	発生初期	5 回以内	株元散布
	アブラムシ類、アザミウマ類	3~6g/m ²			
きく	コガネムシ類幼虫、ヨトウムシ類、ネキリムシ類、ハモグリバエ類	6g/m ²			
	コガネムシ類幼虫、ヨトウムシ類、ネキリムシ類、コナガ	6g/m ²			
カーネーション	アブラムシ類、アザミウマ類	3~6g/m ²			
アリウム	コガネムシ類幼虫、ヨトウムシ類、ネキリムシ類、ネギコガ	6g/m ²			
	スジキリヨトウ、シバツトガ	10g/m ²			全面散布
芝	タマナヤガ	5~10g/m ²			
きゅうり、なす	アブラムシ類、アザミウマ類、オンシツコナジラミ	3~6g/m ²	定植時	1 回	植溝散布又は植穴処理
	コガネムシ類幼虫、ネキリムシ類	(1 株あたり 1~2g)			植穴処理
トマト	アブラムシ類、オンシツ				植溝散布又

	コナジラミ				は植穴処理
キャベツ	アブラムシ類	6g/m ²	育苗期	本剤：1回	散布
	アザミウマ類	6g/m ² (1株あたり2g)	定植時	アセフェート： 2回以内(但し、 定植時までの 処理は1回以 内、定植後の散 布は1回以内)	植穴処理
	アブラムシ類、アオムシ、 コナガ、ヨトウムシ、ネキ リムシ類	3~6g/ m ² (1 株 あ た り 1~2g)			
はくさい					
なばな類*	アブラムシ類	6g/m ²	は種時	1回	植溝土壌混 和
こまつな	アブラムシ類、ネキリムシ 類		は種前		播溝土壌混 和
オクラ	アブラムシ類	6g/m ² (1株あ たり2g)	収穫14日前ま で		株元散布
ブロッコリー	アオムシ、ヨトウムシ、ア ザミウマ類、ネキリムシ 類		定植時		
だいこん	アオムシ、コナガ、アブラ ムシ類	3~4g/m ²	は種前		植溝散布
かぶ	アブラムシ類、ネキリム シ類	4g/m ²	収穫21日前ま で		株元散布
ばれいしょ	アブラムシ類	3~6g/ m ² (1 株 あ た り 1~2g)	植付時	本剤：1回 アセフェート： 3回以内 (但し、植付時の 処理は1回以 内、植付後は2 回以内)	植溝散布
えだまめ	ハスモンヨトウ	3~6g/m ²	収穫21日前ま で	3回以内	生育期株元 散布

つつじ類	ツツジグンバイ	12g/m ²	発生初期	5 回以内	株元散布
樹木類（つつじ類、ポインセチアを除く）	ケムシ類		生育期（樹高 2 m 以下）		

* 「なばな類（茎葉及び花蕾を収穫するもの）」には「太田かぶ」が含まれます。

※2 きく、カーネーション、アリウムを除く

●散布は一ヵ所に集中せず均一に散布してください。

●200g 入ボトルは、容器を上下に軽く4～5回振りますと約1gの散布量になります。

[登録内容変更についてのお願い](#)（2014年9月11日付）

[登録内容変更のご案内](#)（2014年10月17日付）

[登録内容変更についてのお知らせ](#)（2014年11月17日付）

- 2025年7月22日付：きくのコガネムシ類幼虫、こまつなのネキリムシ類、花き類観葉植物（きく、宿根スターチス、カーネーション、アリウムを除く）のネキリムシ類の追加。
- 2025年6月25日付：ピーマンのアブラムシ類の削除
- 2023年8月23日付：かぶのネキリムシ類の追加。
- 2022年10月12日付：ブロッコリー、トマト、きゅうり、なす、つつじ類、さくら（幼木）、さざんかの変更。オクラの追加。樹木類（つつじ類、ポインセチアを除く）の追加。
- 2021年9月28日付：キャベツ、はくさい、ブロッコリーの変更、さざんかの追加。
- 2020年10月14日付：なばなの変更、さくら（幼木）の追加
- 2019年11月20日付：こまつなの追加
- 2018年11月7日付：ブロッコリーの変更、つつじ類の追加
- 2017年9月13日付：キャベツのアザミウマ類の追加
- 2014年11月17日付：ミニトマト、はつかだいこんの削除。その他作物の変更
- 2008年5月14日付：キャベツ、なばなの変更
- 2007年4月11日付：なばなの追加