

パンチョ TF 顆粒水和剤

有効成分：シフルフェナミド…3.4%

トリフルミゾール…15.0%

農林水産省登録 第 21117 号

※印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と、本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期 ※	総使用回数※			
					本剤	シフルフェ ナミド [*]	トリフルミゾー ール	
きゅうり、さやえんどう、トマト、 ミニトマト、いちご、なす、すいか、 メロン、ピーマン、うり類(漬物用)、 実えんどう	うどんこ病	2,000 倍	100～300 L/10a	収穫前日 まで	2 回	2 回	5 回	
かぼちゃ							5 回(種子粉 衣は1 回)	
にがうり							3 回	
ズッキーニ		4,000 倍					4 回	
りんご		2,000 倍					200～700 L/10a	収穫 7 日 前まで
おうとう	灰星病		収穫 14 日前まで	2 回				
麦類	うどんこ病		60～150 L/10a	-			3 回(種子粉 衣は1 回)	
花き類・観葉植物			100～300 L/10a				5 回	5 回
まさき、さるすべり			100～300 L/10a				2 回	2 回

使用方法：散布

- ・ 2026 年 5 月 27 日付：実えんどうの追加
- ・ 2024 年 3 月 4 日付：さやえんどうの追加