

バロックフロアブル

有効成分：エトキサゾール…10.0%

農林水産省登録 第 19962 号

※印は収穫物への残留回避のため、本剤及びエトキサゾールを含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量 ★	使用時期	総使用回数※	使用方法		
かんきつ (みかんを除く)	ミカンハダニ	2,000~3,000 倍	200~700 L/10a	収穫 14 日前まで	2 回以内	散布		
	ミカンサビダニ	2,000 倍						
みかん	ミカンハダニ	2,000~3,000 倍					収穫前日まで	
	ミカンサビダニ	2,000 倍						
りんご	リンゴハダニ	2,000~3,000 倍					収穫 14 日前まで	
	ナミハダニ							
なし	ハダニ類							
もも	ハダニ類、 モモサビダニ							
すもも、 ネクタリン	ハダニ類						収穫 7 日前まで	
ぶどう							1 回	
びわ	ミカンハダニ	2,000 倍						2 回以内
おうとう	ハダニ類						収穫 14 日前まで	1 回
いちじく							収穫前日まで	
マンゴー							収穫 7 日前まで	2 回以内
きゅうり					1 回			
すいか、メロン				100~350 L/10a	収穫前日まで	2 回以内		
なす、いちご					1 回			
とうがん					2 回以内			
みつば		3,000 倍	100~300	収穫前日まで (但し、伏				

			L/10a	せ込み栽培は伏せ込み前まで)	
しそ					
きく(葉) かんしょ		2,000 倍		収穫前日まで	
あずき				収穫 7 日前まで	
食用ミニバラ					収穫 3 日前まで
茶	カンザワハダニ	1,000~3,000 倍	200~400 L/10a	摘採 14 日前まで	1 回
ホップ	ハダニ類	2,000 倍	200~700 L/10a	収穫 7 日前まで	
花き類・観葉植物			100~300 L/10a	発生初期	
樹木類			200~700 L/10a		

★使用液量の単位の読み替え方：「L/10a」=「mL/m²」(例 100~300L/10a = 100~300mL/m²)

- 2015 年 2 月 6 日付：食用ミニバラの追加
- 2017 年 4 月 11 日付：きく(葉)としその追加
- 2019 年 2 月 28 日付：みつばの追加