

## 家庭園芸用 GF オルトラン水和剤

有効成分：アセフェート…50.0%

農林水産省登録 第 21819 号

| 作物名            | 適用害虫名               | 希釈倍数               | 使用液量                          | 使用時期 | 総使用回数※                     | 使用方法          |
|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|------|----------------------------|---------------|
| 花き類・観葉植物       | アブラムシ類、<br>アザミウマ類   | 1,000 ～<br>1,500 倍 | 100 ～<br>300mL/m <sup>2</sup> | 発生初期 | 5 回以内                      | 散布            |
|                | アオムシ、ヨトウムシ類         |                    |                               |      |                            |               |
| きく             | マメハモグリバエ、<br>オオタバコガ |                    |                               |      |                            |               |
| ストック           | コナガ、ハイマダラノメイガ       |                    |                               |      |                            |               |
| 宿根アスター         | ヨメナスジハモグリバエ         |                    |                               |      |                            |               |
| カーネーション        | コナガ                 |                    |                               |      |                            |               |
| ひまわり           | タバコガ                |                    |                               |      |                            |               |
| 斑入りアマドコロ、リアトリス | ハマキムシ類              |                    |                               |      |                            |               |
| オンシジウム         | カイガラムシ類             | 1,000 倍            |                               |      |                            |               |
| グラジオラス         | アザミウマ類              | -                  | -                             | 植付時  | 本剤:1 回<br>アセフェート:5 回<br>以内 | 10 分間<br>球根浸漬 |
| 芝              | スジキリヨトウ、<br>シバツトガ   | 1,000 倍            | 0.25 ～ 2L/<br>m <sup>2</sup>  | 発生初期 | 5 回以内                      | 散布            |
|                | タマナヤガ、ケラ            |                    | 1～2L/m <sup>2</sup>           |      |                            |               |
|                | シバオサゾウムシ成虫          |                    | 2L/m <sup>2</sup>             |      |                            |               |
|                | アカフツヅリガ             |                    | 0.5～1L/m <sup>2</sup>         |      |                            |               |
| さくら            | アザミウマ類              | 1,500 ～<br>2,000 倍 | 200 ～<br>700mL/m <sup>2</sup> | 発生初期 | 5 回以内                      | 散布            |
|                | アメリカシロヒトリ           |                    |                               |      |                            |               |
|                | モンクロシャチホコ           |                    |                               |      |                            |               |

|  |                            |                    |                               |               |  |               |       |
|--|----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|--|---------------|-------|
| つつじ類   | ツツジグンバイ                    | 1,500 倍            | 100 ~<br>300mL/m <sup>2</sup> | 収穫 30<br>日前まで | 本剤:1 回<br>アセフェート:2 回<br>以内(但し、定植時<br>までの処理は 1 回<br>以内、定植後の散<br>布は 1 回以内) |               |       |
|  | つばき類                       | アザミウマ類             |                               |               |  | 1,000 倍       |       |
| チャドクガ  |                            | 1,500 倍            |                               |               |  |               |       |
| 樹木類(つつじ<br>類、つばき類、さ<br>くらを除く)  | アザミウマ類                     | 1,000 倍            |                               |               |  |               |       |
| キャベツ   | アザミウマ類                     | 1,000 倍            |                               |               |  |               |       |
|  | ヨトウムシ、ハスモンヨト<br>ウ、タマナギンウワバ | 1,000 ~<br>1,500 倍 |                               |               |  |               |       |
| はくさい   | アブラムシ類、アオムシ、コ<br>ナガ        | 1,000 ~<br>2,000 倍 |                               |               |  |               |       |
|  | カブラハバチ、ヨトウムシ、<br>ハスモンヨトウ   | 1,500 ~<br>2,000 倍 |                               |               |  |               |       |
| 非結球あぶらな<br>科葉菜類 (ケー<br>ル、からしな、ル<br>ッコラ、四川搾菜<br>(茎葉)、畑わさ<br>び、畑わさび(葉)<br>を除く) | アブラムシ類                     | 1,500 倍            |                               |               |  | 収穫 21<br>日前まで | 1 回   |
| カリフラワー   | ヨトウムシ                      | 1,000 倍            |                               |               |  | 収穫 14<br>日前まで | 3 回以内 |
| レタス  |                            | 1,000 ~<br>1,500 倍 | 収穫 30<br>日前まで                 |               |  |               |       |
| 非結球レタス   | アブラムシ類、アザミウマ<br>類、オオタバコガ   | 1,000 倍            |                               |               |  |               |       |
|  | ばれいしょ                      | ヨトウムシ              | 1,000 ~<br>1,500 倍            | 本剤:2 回以内      |  |               |       |

|           |                      |         |       |             |  |
|-----------|----------------------|---------|-------|-------------|--|
|           | テントウムシダマシ幼虫、ヨトウムシ    | 1,000 倍 |       |             | アセフェート:3 回以内(但し、植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内)              |
| いんげんまめ    | アブラムシ類、インゲンマメゾウムシ    |         |       | 収穫 14 日前まで  | 3 回以内  |
| だいず       | アブラムシ類、ハスモンヨトウ       |         |       | 収穫 60 日前まで  | 3 回以内  |
| えだまめ      |                      |         |       | 収穫 21 日前まで  |  |
| たまねぎ      | ネギアザミウマ、ネギハモグリバエ     |         |       | 収穫 21 日前まで  | 5 回以内  |
| にんにく      | アブラムシ類、アザミウマ、ネギコガ    |         |       | 収穫 7 日前まで   | 2 回以内  |
| 未成熟とうもろこし | アブラムシ類、アワノメイガ        |         |       | 収穫開始 7 日前まで | 1 回  |
| オクラ       | アブラムシ類、フタテンミドリヒメヨコバイ |         |       | 収穫 21 日前まで  | 2 回以内  |
| 葉しょうが     | アワノメイガ               |         |       | 収穫 45 日前まで  |  |
| しょうが      |                      |         |       | 1 回         |  |
| やまのいも     | アブラムシ類、ヤマノイモコガ       |         |       | 収穫 45 日前まで  | 本剤:1 回以内<br>アセフェート:2 回以内(但し、株元散布は 1 回以内、散布は 1 回以内) |
| ごぼう       | アブラムシ類               |         |       |             | 3 回以内  |
| あずき       | アブラムシ類、アズキノメイガ、ヨトウムシ |         |       | 収穫 14 日前まで  | 1 回  |
| さんしょう (果) | チャノキイロアザミウマ          | 1,500 倍 | 200 ~ |             |  |

|      |   |         |                      |               |      |
|------|---|---------|----------------------|---------------|------|
| 実)   |   |         | 700mL/m <sup>2</sup> |               |      |
| かき   | カキクダアザミウマ、カキノヘ<br>タムシガ、チャノキイロアザミ<br>ウマ、フジコナカイガラムシ |         |                      | 収穫 45<br>日前まで | 2回以内 |
| いちじく | アザミウマ類  | 2,000 倍 |                      |               | 1回   |

※印は収穫物への残留回避のため、本剤及びアセフェートを含む農薬の総使用回数の制限を示します。

●2022年11月9日付：にんにくの変更

●2021年12月8日付：さんしょう（果実）、カリフラワー、非結球あぶらな科葉菜類（ケール、からしな、ルッコラ、四川搾菜(茎葉)、畑わさび、畑わさび（葉）を除く）、ごぼう、あずき、葉しょうがの追加、たまねぎ、オクラ、未成熟とうもろこし、芝の変更