

家庭園芸用トップジン M ゾル

有効成分：チオファネートメチル…40.0%

農林水産省登録 第 19783 号

※印は本剤及びその他の有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	総使用回数※	使用 方法	
りんどう	花腐菌核病	1,000 倍	100 ～ 700L/10a	発病初期	5 回以内	散布	
ばら	黒星病		100 ～ 300L/10a	-			
きく	黒斑病、褐斑病						
ゆり	葉枯病						
ストック	菌核病			発病初期			
プリムラ	灰色かび病						
シンジビウム	炭疽病						
トマト	葉かび病、菌核病		収穫前日まで	本剤：5 回以内 チオファネートメチル：6 回以内（但し、種子への処理は 1 回以内、は種後は 5 回以内）			
きゅうり	菌核病、炭疽病						
なす	菌核病						
たまねぎ	灰色腐敗病	600 ～ 1,000 倍		本剤：5 回以内 チオファネートメチル：7 回以内(但し、種子への処理は 1 回以内、苗根部浸漬 1 回以内、無人航空機散布は 3 回以内、散布は 5 回以内)			
だいず	紫斑病	1,000 倍	収穫 14 日前まで	本剤：4 回以内 チオファネートメチル：4 回以内（但し、種子への処理は 1 回以内）			
もも	灰星病	700 倍	200 ～ 700L/10a	収穫前日まで	本剤：6 回以内 チオファネートメチル：10 回以内(但し、塗布は 3 回以内、休眠期の散布は 1 回以内、生育期の散布は 6 回以内)		

おうとう	せん孔病	1,500 倍		収穫 14 日前まで	本剤：3 回以内 チオファネートメチル：6 回以内(但し、塗布は 3 回以内、散布は 3 回以内)
みかん	そうか病	700 ～ 1,000 倍		収穫前日まで	本剤：5 回以内 チオファネートメチル：8 回以内(但し、塗布は 3 回以内、散布、空中散布及び無人航空機散布は合計 5 回以内)
	貯蔵病害(青かび病、緑かび病、軸腐病)	1,000 ～ 2,000 倍			本剤：5 回以内 チオファネートメチル：8 回以内(但し、塗布は 3 回以内、散布及び無人航空機散布は 5 回以内)
かんきつ (みかんを除く)				2,000 倍	
ぶどう	黒とう病	1,000 倍		収穫 45 日前まで	本剤：1 回以内 チオファネートメチル：5 回以内(但し、塗布は 3 回以内、休眠期の散布は 1 回以内、生育期の散布は 1 回以内)
キウイフルーツ	果実軟腐病			収穫前日まで	本剤：5 回以内 チオファネートメチル：8 回以内(但し、塗布は 3 回以内、散布は 5 回以内)

★使用液量の単位の読み替え方：「L/10a」＝「mL/m²」（例 100～300L/10a＝100～300mL/m²）

- 2007 年 9 月 19 日付：たまねぎ、なす、かんきつ（みかんを除く）の追加、みかんの変更
- 2008 年 11 月 19 日付：ぶどうの変更
- 2014 年 6 月 25 日付：かんきつ（みかんを除く）の変更
- 2020 年 12 月 9 日付：だいず、キウイフルーツ、りんどうの追加、たまねぎ、みかん、かんきつ（みかんを除く）の変更