

ダニ太郎

有効成分：ビフェナゼート…20.0%

農林水産省登録 第 21968 号

※印は本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	総使用回数※	使用 方法
きく	ナミハダニ	1,000 倍	100～300L /10 a (100～300mL/m ²)		1 回	散布
ばら、カーネーション、りんどう	ハダニ類			開花前まで		
げっきつ				発生初期		
いちご				収穫前日まで	2 回以内	
すいか、メロン、きゅうり、なす、ピーマン						
トマト、ミニトマト	ハダニ類、トマトサビダニ			1 回		
かんしょ、さといも、やまのいも	ハダニ類	1,500 倍	収穫 3 日前まで			
しそ科葉菜類(えごま(葉)を除く)			収穫 14 日前まで			
さんしょう(葉)			収穫 7 日前まで			
かんきつ	ミカンハダニ、ミカンサビダニ	1,000～1,500 倍	200～700 L/10 a (200～700mL/m ²)	収穫 7 日前まで	1 回	
りんご	ナミハダニ			収穫前日まで		
	リンゴハダニ	1,000 倍				
なし	ハダニ類	1,000～1,500 倍		収穫前日まで		
もも						モモサビダニ
小粒核果類、ネクタリ	ハダニ類	1,000～		収穫 3 日前まで		

ン		1,500 倍				
かき						
あけび(果実)、マンゴー、アテモヤ		1,000 倍	200 ～ 700L /10 a (200～700mL/m ²)	収穫 7 日前まで		
いちじく		1,000 倍		収穫前日まで		
おうとう		1,000～ 1,500 倍	200 ～ 700L/10a(200 ～ 700 mL / m ²)	収穫 14 日前まで		
ぶどう	ブドウサビダニ	1,000 倍		収穫 21 日前まで		散布
茶	カンザワハダニ、 チャノナガサビダニ		200 ～ 400L/10a(200 ～ 400mL/m ²)	摘採 14 日前まで(但し、遮光する栽培では遮光開始 14 日前まで)		