

GF ワイドヒッター顆粒水和剤

有効成分：ベンチアバリカルブイソプロピル…5.0%

TPN…50.0%

農林水産省登録 第 23976 号

※印は収穫物への残留回避のため、本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用時期	総使用回数※							
				本剤	ベンチアバリカルブイソプロピル	TPN					
トマト	葉かび病	1000 倍	収穫前日まで	3 回以内	3 回以内	6 回以内(但し、土壌灌注は 2 回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計 4 回以内)					
	疫病	1000～1500 倍									
ミニトマト		1500 倍		2 回以内		2 回以内					
きゅうり	べと病	1000～1500 倍		収穫 7 日前まで		3 回以内	3 回以内	14 回以内(但し、土壌灌注は 2 回以内、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射は合計 12 回以内)			
	褐斑病、うどんこ病、黒星病										
なす	褐色腐敗病、すすかび病	1000 倍	収穫 14 日前まで		3 回以内	3 回以内		4 回以内			
たまねぎ	べと病、白色疫病、灰色かび病										
ねぎ	べと病、葉枯病			1500 倍			収穫前日まで		3 回以内	3 回以内	4 回以内
らっきょう	白色疫病										
アスパラガス	疫病	750 ～	収穫 7 日		5 回以内	5 回以内		5 回以内			
ばれいしょ											

		1000 倍	前まで			
	夏疫病	1000 倍				
はくさい	べと病、白さび病、黒斑病、白斑病			2 回以内	3 回以内	3 回以内(但し、は種又は定植前の土壌混和は 1 回以内、散布及び無人航空機散布は 2 回以内)
すいか	褐色腐敗病 炭疽病		収穫 3 日 前まで	5 回以内	5 回以内	5 回以内
メロン	べと病、つる枯病					
かぼちゃ	べと病、疫病、 うどんこ病		収穫 7 日 前まで	3 回以内	3 回以内	3 回以内
キャベツ	べと病		収 穫 14 日前まで	2 回以内	2 回以内	3 回以内(但し、は種又は定植前の土壌混和は 1 回以内、散布、無人航空機散布及びエアゾル剤の噴射は合計 2 回以内)
だいず	茎疫病、べと病、 紫斑病		収 穫 21 日前まで			2 回以内
ブロッコリー	べと病		出 蕾 前 (但し、 収 穫 21 日 前 ま で)		3 回以内	3 回以内 (但し、土壌灌注は 1 回以内、散布及び無人航空機散布は合計は 2 回以内)

- 使用液量：100～300mL/m² ●使用方法：散布。
- 2024 年 4 月 24 日付：はくさいの総使用回数を変更。
- 2022 年 6 月 22 日付：きゅうり、トマト、ブロッコリー、キャベツ、ねぎの使用方法の変更。
- 2018 年 11 月 7 日付：ばれいしょ、だいずの変更。ブロッコリーの追加。
- 2019 年 12 月 18 日付：きゅうりの変更。