

モスピラン・トップジン M スプレー

有効成分：アセタミプリド…0.0050%

チオファネートメチル…0.040%

農林水産省登録 第 21309 号

※印は収穫物への残留回避のため、本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用病害虫名	希 釈 倍数	使 用 時期	総使用回数※	使用方法
トマト	アブラムシ類、コナジラミ類、葉かび病	原液	収 穫 前 日 まで	本剤：3 回以内 アセタミプリド：4 回以内（但し、粒剤の定植時までの処理は 1 回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計 3 回以内） チオファネートメチル：6 回以内（但し、種子への処理は 1 回以内、は種後は 5 回以内）	希釈せず そのまま 散布する
きゅうり	アブラムシ類、コナジラミ類、うどんこ病、炭疽病			本剤：3 回以内 アセタミプリド：5 回以内（但し、粒剤の定植時までの処理は 1 回以内、2%粒剤の定植後の株元散布は 1 回以内、散布、くん煙及び 1%粒剤の株元散布は合計 3 回以内） チオファネートメチル：6 回以内（但し、種子への処理は 1 回以内、は種後は 5 回以内）	
なす	アブラムシ類、コナジラミ類、テントウムシダマシ類			本剤：3 回以内 アセタミプリド：4 回以内（但し、粒剤の定植時までの処理は 1 回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計 3 回以内） チオファネートメチル：6 回以内（但し、種子への処理は 1 回以内、は種後は 5 回以内）	
ばれいしょ	テントウムシダマシ類		収 穫 7 日 前 ま で	本剤：3 回以内 アセタミプリド：4 回以内（但し、植付時の土壌混和は 1 回以内、植付後は 3 回以内） チオファネートメチル：5 回以内（但し、種いもへの処理は 1 回以内）	

キャベツ	アブラムシ類			本剤： 2 回以内 アセタミプリド：6 回以内（但し、粒剤の定植時までの処理は 1 回以内、散布及び定植後の株元散布は合計 5 回以内） チオファネートメチル：3 回以内（但し、種子への処理は 1 回以内、は種後は 2 回以内）	
レタス	アブラムシ類			本剤： 2 回以内 アセタミプリド：4 回以内（但し、粒剤の株元散布は 1 回以内、散布は 3 回以内） チオファネートメチル：4 回以内（但し、種子への処理は 1 回以内、灌注は 1 回以内、散布は 2 回以内）	
はくさい	菌核病		収 穫 14 日 前 ま で 本剤： 2 回以内 アセタミプリド：4 回以内（但し、粒剤の定植時までの処理は 1 回以内、散布及び定植後の株元散布は合計 3 回以内） チオファネートメチル：3 回以内（但し、種子への処理は 1 回以内、は種後は 2 回以内）		
ばら	アブラムシ類、うどんこ病、黒星病		発 生 初期 5 回以内		
きく	アブラムシ類、ミナミキイロアザミウマ、褐斑病、黒斑病				
シンビジウム	アブラムシ類、炭疽病				
プリムラ	アブラムシ類、灰色かび病				
花き類・観葉植物（きく、ばら、プリムラ、シンビジウムを除く）	アブラムシ類				

- 2007 年 10 月 17 日付：なすの変更
- 2009 年 5 月 13 日付：使用回数の変更

- 2015 年 2 月 18 日付：きゅうりの変更
- 2018 年 10 月 10 日付：はくさい、レタス、ばれいしょの追加
- 2020 年 5 月 13 日付：なすの変更
- 2021 年 2 月 10 日付：はくさい、レタスの変更、キャベツの追加