

## GF モストップジン R スプレー

有効成分：アセタミプリド…0.0050%

フェンプロパトリン…0.010%

チオファネートメチル…0.040%

農林水産省登録 第 22952 号

※印は本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用病害虫名	希 積 倍 数	使 用 時 期	総使用回数※	使用方法
きく	アブラムシ類、ハダニ類、 褐斑病	原 液	発 生 初 期	本剤：5回以内 アセタミプリド：5回以内 フェンプロパトリン：6回以内 チオファネートメチル：5回以内	希積せず そのまま 散布する
ばら	アブラムシ類、ハダニ類、 うどんこ病、黒星病				
ペチュニア	アブラムシ類、ハダニ類、 うどんこ病				
花き類・観葉 植物(きく、ば ら、ペチュニ アを除く)	アブラムシ類、ハダニ類				
トマト	アブラムシ類、うどんこ 病、葉かび病				
きゅうり	アブラムシ類、ハダニ類、 うどんこ病		本剤：3回以内 アセタミプリド：5回以内(但し、 粒剤の定植時までの処理は1回以		

			<p>内、2%粒剤の定植後の株元散布は1回以内、散布、くん煙及び1%粒剤の株元散布は合計3回以内)</p> <p>フェンプロパトリン：5回以内、 チオファネートメチル：6回以内(但し、種子への処理は1回以内、は種後は5回以内)</p>
なす	アブラムシ類、ハダニ類、うどんこ病		<p>本剤：3回以内、 アセタミプリド：4回以内(但し、粒剤の定植時までの処理は1回以内、散布、くん煙及び定植後の株元散布は合計3回以内)</p> <p>フェンプロパトリン：5回以内、 チオファネートメチル：6回以内(但し、種子への処理は1回以内、は種後は5回以内)</p>

- (2016年3月2日付：きくの変更)