

ネキリベイト

有効成分：ペルメトリン…0.10%

農林水産省登録 第 23683 号

※印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期※	総使用回数※	使用方法
花き類・観葉植物	ネキリムシ類	3g/m ²	生育初期	6回以内	株元散布
はくさい、ごぼう			は種時～生育初期	5回以内	
だいこん				4回以内	
オクラ				3回以内	
キャベツ			生育初期	本剤：5回以内 ペルメトリン：5回以内（但し、株元灌注は2回以内）	
レタス、ブロッコリー、カリフラワー、ピーマン、いちご、たまねぎ、かんしょ、やまのいも、さといも、かぼちゃ				5回以内	
なばな類*、ねぎ、わけぎ、あさつき、豆類(未成熟)、そらまめ、だいず、なす、きゅうり、トマト				3回以内	
ミニトマト				本剤：1回 ペルメトリン：4回以内（但し、株元散布は1回以内、散布及び噴射は合計3回以内）	
とうもろこし、ばれいしょ、とうき				4回以内	
ほうれんそう、しゅんぎく				2回以内	
たかな	生育初期(但し、収穫14日前まで)	本剤：2回以内 ペルメトリン：5回以内（但し、乳剤は3回以内、粒剤は			

				2回以内)
非結球レタス				本剤：2回以内 ペルメトリン：4回以内（但し、乳剤は2回以内、粒剤は2回以内）
にんじん				5回以内
ズッキーニ			生育初期(但し、収穫開始7日前まで)	本剤：3回以内 ペルメトリン：6回以内（但し、乳剤は3回以内、粒剤は3回以内）
もりあざみ				3回以内
エンサイ			生育初期(但し、収穫14日前まで)	2回以内
ヤングコーン				4回以内
葉しょうが			生育初期(但し、収穫30日前まで)	
しょうが			定植時～発芽期(但し、収穫120日前まで)	
エンダイブ			定植時(但し、収穫21日前まで)	2回以内
かぶ			収穫3日前まで	本剤：4回以内 ペルメトリン：4回以内（但し、散布は2回以内）
にら、にら(花茎)				3回以内
アスパラガス、パセリ			収穫前日まで	
とうがらし類			収穫開始7日前まで	2回以内
はっか			収穫前日まで	
にんにく			生育初期(但し、収穫90日前まで)	本剤：2回以内 ペルメトリン：4回以内（但し、乳剤は2回以内、粒剤は2回以内）
しそ			収穫前日まで	2回以内)

らっかせい			収穫 7 日前まで	3 回以内	
びやくし			収穫 90 日前まで	4 回以内	

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期※	総使用回数※	使用方法
ごぼう	ネキリムシ類	3g/m ²	は種後～発芽前	5 回以内	土壌表面散布
やまのいも			植付前		
たまねぎ			定植前		

●本剤 40 粒 (長さ 3～10 mm 位のもの) で約 1 g です。散布は一カ所に集中せず均一に散布するとより効果的です。

* 「なばな類 (茎葉及び花蕾を収穫するもの)」には「太田かぶ」が含まれます。

- 2026 年 4 月 22 日付：とうきの追加。
- 2024 年 8 月 7 日付：ごぼう、やまのいも、たまねぎの変更。
- 2022 年 8 月 30 日付：しそ、ミニトマトの変更。
- 2022 年 2 月 9 日付：たかな、非結球レタスの追加。
- 2020 年 6 月 18 日付：かぶの変更。
- 2019 年 5 月 15 日付：キャベツの変更、ズッキーニ、にんにく、ヤングコーンの追加。
- 2018 年 3 月 28 日付：はっか、しそ、らっかせい、びやくしの変更。