

オルトラン DX 粒剤

有効成分：アセフェート…2.5%

クロチアニジン…0.25%

農林水産省登録 第 21733 号

※印は本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	総使用回数※	使用方法
花き類・観葉植物 （ばら、ペゴニア、はばたん、ガーベラを除く）	アブラムシ類	1 g/株 (但し、40g/㎡まで)	発生初期	本剤:4 回以内 アセフェート:5 回以内 クロチアニジン:4 回以内	生育期 株元処理
ばら	アブラムシ類	1g/株 (但し、40g/㎡まで)			
	アザミウマ類、 コガネムシ類幼虫、 クロケシツブチョッキリ、 チュウレンジハバチ	2g/株 (但し、40g/㎡まで)			
	はばたん	アブラムシ類、 アオムシ			
ペゴニア	アブラムシ類、 コガネムシ類幼虫				
ガーベラ	アブラムシ類、 ハモグリバエ類				
クロトン	ミカンコナカイガラムシ				
トマト	アブラムシ類	1g/株	定植時	本剤:1 回 アセフェート:1 回 クロチアニジン:4 回以内 （但し、育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計 1 回以内、 散布及び定植後の株元散布は合計 3 回以内）	植穴処理 土壌混和
なす		2g/株			
きゅうり					