

## ベニカ A スプレー

有効成分：ペルメトリン…0.010%

農林水産省登録 第 24360 号

※印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫（摘採）前の日数と、本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

### ①散布剤として使用する場合

作物名	適用害虫名	使用時期※	総使用回数※	
ミニトマト	アブラムシ類、ホシツコナジラミ	収穫前日まで	本剤：3回以内 ペルメトリン：4回以内(但し、株元散布は1回以内、散布及び噴射は合計3回以内)	
トマト			3回以内	
なす				アブラムシ類、ホシツコナジラミ、カメムシ類、テントウムシダマシ類
ピーマン				アブラムシ類、カメムシ類、タバコガ
とうがらし類	アブラムシ類、タバコガ	収穫7日前まで	2回以内	
きゅうり	アブラムシ類、ホシツコナジラミ、ウリハムシ	収穫前日まで	3回以内	
ズッキーニ	アブラムシ類、フキノメガ	収穫7日前まで	本剤：3回以内 ペルメトリン：6回以内(但し、乳剤は3回以内、粒剤は3回以内)	
すいか、メロン、かぼちゃ	アブラムシ類	収穫前日まで	5回以内	
キャベツ	アブラムシ類、アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、タマネギソウワバ	収穫3日前まで	本剤：5回以内 ペルメトリン：5回以内(但し、株元灌注は2回以内)	
はくさい	アブラムシ類、アオムシ、コナガ、ヨトウムシ	収穫7日前まで	5回以内	
だいこん	アブラムシ類、アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、ハマダラメガ、ダイコンハムシ	収穫30日前まで	4回以内	
茎ブロッコリー	アオムシ	収穫7日前まで	3回以内	
ブロッコリー、カ	アブラムシ類、コナガ	収穫3日前まで	5回以内	

リフラワー			
かぶ	アオムシ	収穫前日まで	本剤：2回以内 ペルメトリン：4回以内（但し、散布は2回以内）
非結球あぶらな科 葉菜類（みずな、なばな類*を除く）			3回以内
みずな			
なばな類*	コナガ	収穫14日前まで	
非結球レタス	アブラムシ類、ヨトウムシ	収穫前日まで	本剤：2回以内 ペルメトリン：4回以内（但し、乳剤は2回以内、粒剤は2回以内）
レタス		収穫3日前まで	5回以内
ねぎ	アザミウマ類、ネギコガ、シロイモシヨトウ	収穫7日前まで	3回以内
にんにく	アブラムシ類、ネギコガ	収穫前日まで	本剤：2回以内 ペルメトリン：4回以内(但し、乳剤は2回以内、粒剤は2回以内)
アスパラガス	アブラムシ類、ヨトウムシ、カメムシ類、ジュウホシクビナガハムシ	収穫前日まで	3回以内
ばれいしょ	アブラムシ類、テントウムシダマシ類	収穫14日前まで	4回以内
やまのいも	アブラムシ類、アザミウマ類、ヤマノイモコガ	収穫7日前まで	5回以内
さといも	アブラムシ類、ハスモンヨトウ、スズメガ類		
さといも(葉柄)	アブラムシ類、ハスモンヨトウ		2回以内
オクラ	アブラムシ類、カメムシ類、ハスモンヨトウ	収穫前日まで	3回以内
つるむらさき	ヨトウムシ	収穫7日前まで	2回以内
とうもろこし	アブラムシ類、アワノメイガ	収穫14日前まで	4回以内
あずき	アブラムシ類、アズキノメイガ	収穫7日前まで	3回以内
ごぼう	アブラムシ類、ヨトウムシ		5回以内
なし	アブラムシ類、シクイムシ類、ハマキムシ類、	収穫前日まで	2回以内

	カメムシ類		
もも	アブラムシ類、シクイムシ類、ハマキムシ類、カメムシ類、モモハモグ リガ	収穫 7 日前まで	6 回以内
ネクタリン	アブラムシ類、シクイムシ類、カメムシ類、モモハモグ リガ		3 回以内
かき	カキノハタムシガ、チャノキイロアザ ミウマ、カメムシ類、カキクダ アザ ミウマ		5 回以内
キウイフルーツ	キイロマイコガ、カメムシ類		
くり	クリタマハチ	羽化脱出期(但し、収穫 14 日前まで)	
	クリシギゾウムシ		
かんきつ★	アブラムシ類、ミカンハモグ リガ、チャノキイロアザ ミウマ、カメムシ類	収穫 14 日前まで	6 回以内
いちじく	アブラムシ類、アザ ミウマ類、イチジクヒトリモトキ	収穫前日まで	2 回以内
はまなす(果実)	シクイムシ類	収穫 7 日前まで	
さるなし	キイロマイコガ		
ハスカップ	アブラムシ類、ハマキムシ類	収穫 3 日前まで	
食用亜麻	ヨトウガ	収穫 14 日前まで	
茶	チャノココクモンハマキ、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノホソガ、チャノキイロアザ ミウマ	摘採 14 日前まで	1 回以内
花き類・観葉植物(はぼたんを除く)	アブラムシ類、カメムシ類、ハマキムシ類、ヨトウムシ類	発生初期	6 回以内
はぼたん	アブラムシ類、カメムシ類、ハマキムシ類、ヨトウムシ類、アオムシ		
樹木類(くちなしを除く)	アブラムシ類、ケムシ類、シャクトリムシ類		
くちなし	アブラムシ類、アザ ミウマ類、ケムシ類、シャクトリムシ類		

●希釈倍数：原液 ●使用方法：散布

\* 「なばな類」には「太田かぶ」が含まれます。

★みかん、レモン、ゆず、きんかんは作物名のかんきつに含まれる。

②土壌灌注として使用する場合

作物名	適用害虫名	使用液量	使用時期※	総使用回数※
キャベツ	ネリムシ類	10mL/株	収穫 21 日前 まで	本剤：2 回以内 ペルメトリン：5 回以内（但し、株元灌注は 2 回以内）

●希釈倍数：原液 ●使用方法：株元灌注

使用液量の目安：10mL/株は本容器約 10 回の噴霧量です。

・2022 年 9 月 7 日付：非結球レタス（リーフレタスを除く）、リーフレタスの統合。非結球レタスの変更。

・2022 年 8 月 30 日付：ミニトマトの追加。しろな、非結球あぶらな科葉菜類（しろな、みずな、なばな類を除く）の変更

・2022 年 2 月 9 日付：非結球レタス（リーフレタスを除く）、リーフレタスの変更。

・2021 年 10 月 13 日付：ごぼう、キャベツ、だいこん、レタス、リーフレタスの変更、非結球あぶらな科葉菜類（しろな、みずな、なばな類を除く）、みずな、非結球レタス（リーフレタスを除く）、かぶの追加