

家庭園芸用マラソン乳剤

有効成分：マラソン…50.0%

農林水産省登録 第 21940 号

※印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と本剤及びマラソンを含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	使用方法	総使用回数※
花き類・観葉植物	アブラムシ類、ハダニ類、アザミウマ類	2,000 倍	100 ～ 300mL/ m ²	発生初期	散布	6 回以内
きく	ヨトウムシ類					
サルビア	オンブバッタ					
マリーゴールド	ハモグリバエ類					
トマト、ピーマン、かぼちゃ	アブラムシ類、ハダニ類	1,000 倍		収穫前日まで		5 回以内
なす、すいか						6 回以内
きゅうり、メロン						ウリハムシ
にがうり	アブラムシ類					
うり類（漬物用）	アブラムシ類、ハダニ類	2,000～ 3,000 倍		1,000 倍		
	ウリハムシ					
いちご	アブラムシ類、ハダニ類、ミカンキイロアザミウマ	2,000 倍	1,000 倍	収穫 3 日前まで	5 回以内	
レタス	アブラムシ類					
キャベツ、はくさい	アブラムシ類、アザミウマ類	1,000 倍	1,000 倍	収穫前日まで		
	アオムシ、カブラハバチ					
カリフラワー、ブロッコリー	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000 倍	1,000 倍	収穫 3 日前まで		
	アオムシ					
だいこん	アブラムシ類	2,000 倍		収穫 14 日	6 回以内	

	アオムシ、ナモグリバエ	1,000 倍		前まで						
ねぎ	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000 倍		200 ~ 700mL/ m ²		収穫 7 日 前まで				
	ネギハモグリバエ	1,000 倍								
たまねぎ	アブラムシ類、アザミウマ類	2,000 倍				200 ~ 700mL/ m ²	収穫 7 日 前まで			
	ハモグリバエ類	1,000 倍								
にんじん	アブラムシ類、キアゲハ、ヤ サイゾウムシ	2,000 倍					200 ~ 700mL/ m ²	収穫 14 日 前まで	4 回以内	
ほうれんそう	アブラムシ類									
かぶ										
豆類 (未成熟)	アブラムシ類、ハダニ類、コ ガネムシ類、アザミウマ類、 インゲンテントウ	1,000 倍						200 ~ 700mL/ m ²	収穫 7 日 前まで	3 回以内
	ハモグリバエ類、カメムシ 類、マメシンクイガ									
だいず、あずき、 えんどうまめ、い んげんまめ	アブラムシ類、ハダニ類、コ ガネムシ類、アザミウマ類	2,000 倍	200 ~ 700mL/ m ²		収穫 7 日 前まで				6 回以内	
	ハモグリバエ、マメシンクイ ガ	1,000 倍								
ぶどう	アブラムシ類、ハダニ類	2,000 倍		200 ~ 700mL/ m ²	収穫 7 日 前まで				本剤：5 回以内 マラソン：5 回以内 (但し、休眠期の 50 倍希釈散布は 1 回以 内)	
おうとう	アブラムシ類									
びわ	アブラムシ類				5 回以内					
うめ	アブラムシ類、ハマキムシ 類、カイガラムシ類									
りんご	アブラムシ類、ハダニ類、リ ンゴワタムシ					収穫 14 日 前まで	本剤：5 回以内 マラソン：5 回以内 (但し、休眠期から芽 出直後までは 1 回以			

					内)
もも	アブラムシ類、ハダニ類、カイガラムシ類			収穫 7 日前まで	5 回以内
かんきつ(なつみかんを除く)	アブラムシ類、ハダニ類、ハマキムシ類、カイガラムシ類			収穫 14 日前まで	
かき	ハマキムシ類、カイガラムシ類、イラガ類			収穫 30 日前まで	4 回以内

- (2009年3月17日付：注意事項の変更)
- (2011年11月9日付：作物名の削除、使用液量の追加)
- (2012年11月21日付：作物名「セルリー」を削除。作物名「かぶ」の使用時期を「収穫7日前まで」から「収穫14日前まで」に変更。)