

家庭園芸用サンケイダイアジノン粒剤 3

有効成分：ダイアジノン…3.0%

農林水産省登録 第 19526 号

※印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と本剤及びその有効成分含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期 ※	総使用回数※	使用方法
レタス	ケラ、ネキリムシ類	6～9g /㎡	は種時又は植付時	2 回以内	土 壌 混和
	コガネムシ類幼虫		植付前		
キャベツ	ケラ、ネキリムシ類、 コガネムシ類幼虫		30 日前まで	本剤：2 回以内 ダイアジノン：2 回以内 (但し、粒剤の生育期の処理は 1 回以内)	
カリフラワー、 ブロッコリー					
トマト、ピーマン、 とうがらし類		本剤：1 回 ダイアジノン：3 回以内 (但し、生育期は 2 回以内)			
なす			本剤：1 回 ダイアジノン：3 回以内 (但し、粒剤の生育期の処理は 2 回以内)		
きゅうり	タネバエ、ケラ、ネキリムシ類、ウリハムシ 幼虫、コガネムシ類幼虫	6～8g/㎡	植付時	本剤：1 回 ダイアジノン：2 回以内	
すいか、メロン、 かぼちゃ				本剤：1 回 ダイアジノン：4 回以内 (但し、粒剤の生育期の処理は 3 回以内)	
ねぎ、わけぎ、あ さつき	タネバエ、コガネムシ 類幼虫			本剤:1 回 ダイアジノン:2 回以内	
たまねぎ	タネバエ、タマネギバ エ、コガネムシ類幼				

	虫、ケラ、コオロギ			
はくさい	ケラ、ネキリムシ類、 コガネムシ類幼虫	6g/m ²	は種時	1 回
だいこん、はつかだいこん	ケラ、ネキリムシ類、 タネバエ、コガネムシ 類幼虫	6～8g /m ²		本剤:1 回 ダイアジノン:2 回以内 (但し、生育期は 1 回以内)
豆類（種実）	ケラ、タネバエ、コガ ネムシ類幼虫	6～8g/m ²		本剤:1 回 ダイアジノン:だいたいは 6 回以内(種 子粉衣は 1 回以内、粒剤は 5 回以内 (生育期の処理は 4 回以内))、あず きは 4 回以内（種子粉衣は 1 回以 内、は種時の処理は 1 回以内、生育 期の処理は 3 回以内）、いんげんま めは 3 回以内（種子粉衣は 1 回以 内、粒剤は 2 回以内）、らっかせいは 1 回、上記以外の豆類（種実）は 4 回 以内（種子粉衣は 1 回以内、粒剤は 3 回以内）
かんしょ (さつまいも)	コガネムシ類幼虫	6～9g/m ²	植付前及 び収穫 30 日前まで	本剤:3 回以内 ダイアジノン:3 回以内(但し、マイク ロカプセル剤の植付前の処理は 1 回 以内、マイクロカプセル剤の散布は 2 回以内、粒剤の散布は 2 回以内)
	ケラ、ネキリムシ類		植付前	本剤:1 回 ダイアジノン:3 回以内(但し、マイク ロカプセル剤の植付前の処理は 1 回 以内、マイクロカプセル剤の散布は 2 回以内、粒剤の散布は 2 回以内)
ばれいしょ (じゃがいも)				本剤:1 回 ダイアジノン:3 回以内(但し、植付前 の土壌混和は 1 回以内)

- 2011 年 2 月 16 日付：豆類（種実）の変更
- 2013 年 1 月 30 日付：わうり、みかんの削除
- 計量スプーン（小さじ・5 ml）のすり切り 1 杯で 6～8g になります。