

## ナメトックススプレー

有効成分：メタアルデヒド…0.15%

農林水産省登録 第 24761 号

※印は収穫物への残留回避のため、本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

### ①作物に直接散布する場合

作物名	適用場所	適用害虫名	使用時期	総使用回数※	
				本剤	メタアルデヒド
花き類・観葉植物	花き類・観葉植物栽培温室等の生息地	ナメクジ類、カタツムリ類	—	6回以内	6回以内
キャベツ、レタス	—		収穫 14 日前まで	3回以内	6回以内（但し、散布及び株元散布は合計 3 回以内（株元散布は 2 回以内））
かんきつ			収穫 30 日前まで		6回以内（但し、散布及び株元散布は合計 3 回以内）

●希釈倍数：原液 ●使用方法：散布

### ②作物にかからないように土壌表面散布する場合

作物名	適用場所	適用害虫名	使用時期	総使用回数※	
				本剤	メタアルデヒド
野菜類※1	ほ場周辺雑草地の生息地	ナメクジ類、カタツムリ類	—	6回以内	6回以内
いちご					6回以内（但し、株元散布は 2 回以内）
はくさい、アスパラガス、セルリー、非結球あぶらな科葉菜類					6回以内（但し、散布及び株元散布は合計 3 回以内（株元散布は 2 回以内））
キャベツ、レタス					6回以内（但し、散布は 3 回以内）
非結球レタス★1					6回以内（但し、散布及び株元散布は合計 2 回以内）
ふき					6回以内
果樹類 (かんきつを除く)					6回以内

かんきつ				6回以内 (但し、散布及び株元散布は合計 3回以内)
------	--	--	--	----------------------------------

●希釈倍数：原液 ●使用方法：作物にかからないように土壌表面散布する。

※1：いちご、はくさい、アスパラガス、セルリー、非結球あぶらな科葉菜類、キャベツ、レタス、非結球レタス、ふき、れんこんを除く

★1 「非結球レタス」には、リーフレタス、ロメインレタス、サンチュ等が含まれる。

・2023年11月08日付：アスパラガス、セルリー、非結球あぶらな科葉菜類、ふきの追加