

## ベニカ S 乳剤

有効成分：ペルメトリン…2.0%

農林水産省登録 第 23112 号

※印は収穫物への残留回避のため、本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

| 作物名          | 適用害虫名                         | 希釈倍数      | 使用液量                 | 使用時期※     | 総使用回数※ | 使用<br>方法 |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------------------|-----------|--------|----------|
| 樹木類（くちなしを除く） | アブラムシ類、ケムシ類、シャクトリムシ類、コガネムシ類成虫 | 400～800 倍 | 200 ～<br>700mL/<br>㎡ | 発生初期      | 6 回以内  | 散布       |
| くちなし         | アブラムシ類、ケムシ類、シャクトリムシ類、コガネムシ類成虫 |           |                      |           |        |          |
|              | アザミウマ類                        | 200 倍     |                      |           |        |          |
| なし           | アブラムシ類、シンクイムシ類                | 200～300 倍 |                      | 収穫前日まで    | 2 回以内  |          |
|              | ハマキムシ類、カメムシ類                  | 200 倍     |                      |           |        |          |
| もも           | カメムシ類                         | 200 倍     |                      | 収穫 7 日前まで | 6 回以内  |          |
|              | アブラムシ類、シンクイムシ類                | 200～300 倍 |                      |           |        |          |
|              | モモハモグリガ                       | 200～400 倍 |                      |           |        |          |
|              | ハマキムシ類                        | 300 倍     |                      |           |        |          |
| ネクタリン        | カメムシ類                         | 200 倍     |                      |           | 3 回以内  |          |
|              | アブラムシ類、シンクイムシ類                | 200～300 倍 |                      |           |        |          |
|              | モモハモグリガ                       | 200～400 倍 |                      |           |        |          |
| うめ           | アブラムシ類                        | 300 倍     |                      | 収穫前日まで    | 2 回以内  |          |
| かき           | カキノヘタムシガ、カメムシ類、チャノキイ          | 200～300 倍 |                      | 収穫 7 日前まで | 5 回以内  |          |

|              |                 |           |           |                                                  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|
|              | ロアザミウマ          |           |           |                                                  |  |  |  |  |
|              | カキクダアザミウマ       | 200 倍     |           |                                                  |  |  |  |  |
| キウイフルーツ      | キイロマイコガ         | 200～300 倍 |           |                                                  |  |  |  |  |
|              | カメムシ類           | 200 倍     |           |                                                  |  |  |  |  |
| くり           | クリタマバチ          | 100～200 倍 |           |                                                  |  |  |  |  |
|              | クリシギゾウムシ        | 200 倍     |           |                                                  |  |  |  |  |
| かんきつ         | アブラムシ類、ミカンハモグリガ | 200～400 倍 |           |                                                  |  |  |  |  |
|              | チャノキイロアザミウマ     | 200～300 倍 |           |                                                  |  |  |  |  |
|              | カメムシ類           | 200 倍     |           |                                                  |  |  |  |  |
| いちじく         | アザミウマ類、アブラムシ類   | 200 倍     |           |                                                  |  |  |  |  |
|              | イチジクヒトリモドキ      | 300 倍     |           |                                                  |  |  |  |  |
| さるなし         | キイロマイコガ         | 200 倍     |           |                                                  |  |  |  |  |
| はまなす（果実）     | シンクイムシ類         | 200 倍     |           |                                                  |  |  |  |  |
| アロニア         |                 | 300 倍     |           |                                                  |  |  |  |  |
| ハスカップ        | アブラムシ類、ハマキムシ類   | 200～300 倍 |           |                                                  |  |  |  |  |
| ズッキーニ        | フキノメイガ          |           | 収穫 7 日前まで | 本剤：3 回以内<br>ペルメトリン：6 回以内（但し、乳剤は 3 回以内、粒剤は 3 回以内） |  |  |  |  |
| きゅうり         | アブラムシ類          |           | 収穫前日まで    | 3 回以内                                            |  |  |  |  |
| すいか、メロン、かぼちゃ |                 |           |           | 5 回以内                                            |  |  |  |  |
| いちご          |                 |           |           | 3 回以内                                            |  |  |  |  |
| トマト、なす       |                 |           |           |                                                  |  |  |  |  |

|               |                         |          |  |          |                                                   |
|---------------|-------------------------|----------|--|----------|---------------------------------------------------|
| ミニトマト         |                         |          |  |          | 本剤：3回以内<br>ペルメリン：4回以内（但し、株元散布は1回以内、散布及び噴射は合計3回以内） |
| ごぼう           | ヨトウムシ                   | 200倍     |  | 収穫7日前まで  | 5回以内                                              |
| 葉ごぼう          | アブラムシ類                  | 300倍     |  | 収穫14日前まで | 2回以内                                              |
| だいず           | マメシンクイガ                 | 300倍     |  | 収穫7日前まで  | 3回以内                                              |
| ピーマン          | タバコガ                    | 200倍     |  | 収穫前日まで   | 5回以内                                              |
| キャベツ          | アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、タマナギンウワバ |          |  | 収穫3日前まで  | 本剤：5回以内<br>ペルメリン：5回以内（但し、株元灌注は2回以内）               |
| はくさい          | アオムシ、コナガ、ヨトウムシ          |          |  | 収穫7日前まで  | 5回以内                                              |
| だいこん          | ハイマダラノメイガ               |          |  | 収穫30日前まで | 4回以内                                              |
| ブロッコリー、カリフラワー | コナガ                     |          |  | 収穫3日前まで  | 5回以内                                              |
| 茎ブロッコリー       | アオムシ                    |          |  | 収穫7日前まで  | 3回以内                                              |
| かぶ            |                         |          |  | 収穫前日まで   | 本剤：2回以内<br>ペルメリン：4回以内（但し、散布は2回以内）                 |
| レタス           | ヨトウムシ                   | 200～300倍 |  | 収穫3日前まで  | 5回以内                                              |
| 非結球レタス        |                         |          |  | 収穫前日まで   | 本剤：2回以内<br>ペルメリン：4回以内（但し、乳剤は2回以内、粒剤は2回以内）         |
| しゅんぎく         | アブラムシ類                  | 400倍     |  | 収穫21日前まで | 2回以内                                              |
| トレビス          |                         | 300倍     |  | 収穫7日前まで  | 3回以内                                              |

|                                    |                               |            |  |            |                                               |
|------------------------------------|-------------------------------|------------|--|------------|-----------------------------------------------|
| にんにく                               |                               | 200～300 倍  |  | 収穫前日まで     | 本剤：2 回以内<br>ペルメリン：4 回以内（但し、乳剤は2 回以内、粒剤は2 回以内） |
| たまねぎ                               | ネギコガ、ハスモンヨトウ                  | 300 倍      |  | 収穫 7 日前まで  | 5 回以内                                         |
| ねぎ                                 | ネギコガ                          | 200 倍      |  | 収穫前日まで     | 3 回以内                                         |
|                                    | シロイチモジヨトウ                     |            |  |            |                                               |
| アスパラガス                             | ヨトウムシ                         |            |  |            |                                               |
| 豆類(未成熟、ただし、えだまめ、未成熟そらまめ、さやえんどうを除く) | ヨトウムシ類、ウラナミシジミ、フキノメイガ、マメシンクイガ | 300 倍      |  | 収穫 14 日前まで |                                               |
| 未成熟そらまめ                            |                               |            |  | 収穫 7 日前まで  |                                               |
| えだまめ                               | ヨトウムシ類、ウラナミシジミ、マメシンクイガ        |            |  | 収穫前日まで     |                                               |
| さやえんどう                             | ヨトウムシ類、ウラナミシジミ                |            |  | 収穫前日まで     |                                               |
| そらまめ                               | アブラムシ類                        |            |  | 収穫 7 日前まで  |                                               |
| ほうれんそう                             |                               |            |  | 収穫 14 日前まで | 2 回以内                                         |
| はこべ                                | オオタバコガ                        | 収穫 21 日前まで |  | 1 回        |                                               |
| しそ                                 | ハスモンヨトウ                       | 400 倍      |  | 収穫前日まで     | 本剤：2 回以内<br>ペルメリン：4 回以内（但し、乳剤は2 回以内、粒剤は2 回以内） |
| とうがらし類                             | タバコガ                          | 200 倍      |  | 収穫 7 日前まで  | 2 回以内                                         |
| とうもろこし                             | アワノメイガ                        |            |  | 収穫 14 日前まで | 4 回以内                                         |
| あずき                                | アズキノメイガ                       |            |  | 収穫 7 日前まで  | 3 回以内                                         |

|                                      |                          |           |                      |            |       |  |           |  |  |  |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------|------------|-------|--|-----------|--|--|--|
| ばれいしょ                                | テントウムシダマシ類               | 200～300 倍 |                      | 収穫 14 日前まで | 4 回以内 |  |           |  |  |  |
| やまのいも                                | ヤマノイモコガ                  |           |                      | 収穫 7 日前まで  | 5 回以内 |  |           |  |  |  |
| さといも                                 | ハスモンヨトウ                  |           |                      |            | 200 倍 |  | 2 回以内     |  |  |  |
| さといも（葉柄）                             |                          |           |                      |            | 300 倍 |  | 5 回以内     |  |  |  |
| かんしょ                                 | イモコガ                     | 300 倍     |                      |            |       |  |           |  |  |  |
| 茶                                    | チャノコカクモンハマキ              | 200 倍     | 200 ～<br>400mL/<br>㎡ | 摘採 14 日前まで | 1 回   |  |           |  |  |  |
|                                      | チャノホソガ                   | 200～300 倍 |                      |            |       |  |           |  |  |  |
| オクラ                                  | ハスモンヨトウ                  | 200 倍     | 100 ～<br>300mL/<br>㎡ | 収穫前日まで     | 3 回以内 |  |           |  |  |  |
| 非結球あぶらな科<br>葉菜類（非結球はくさい、みずな、なばな類を除く） | アオムシ                     |           |                      |            |       |  |           |  |  |  |
| なばな類                                 | アオムシ、コナガ                 |           |                      |            |       |  |           |  |  |  |
| みずな                                  | アオムシ                     |           |                      |            |       |  |           |  |  |  |
|                                      | ダイコンハムシ                  |           |                      |            |       |  | 300 倍     |  |  |  |
| 非結球はくさい                              | アオムシ                     |           |                      |            |       |  | 200～400 倍 |  |  |  |
| つるむらさき                               | ヨトウムシ                    | 200 倍     |                      | 収穫 7 日前まで  | 2 回以内 |  |           |  |  |  |
| ごま                                   | アブラムシ類                   |           |                      | 収穫 3 日前まで  | 3 回以内 |  |           |  |  |  |
| 食用ゆり                                 |                          | 300 倍     |                      | 収穫前日まで     | 5 回以内 |  |           |  |  |  |
| 食用亜麻                                 | ヨトウガ                     | 200 倍     |                      | 収穫 14 日後まで | 2 回以内 |  |           |  |  |  |
| はばたん                                 | アブラムシ類                   | 200～400 倍 |                      | 発生初期       |       |  | 6 回以内     |  |  |  |
|                                      | カメムシ類、ハマキムシ類、ヨトウムシ類、アオムシ | 200 倍     |                      |            |       |  |           |  |  |  |
| 花き類・観葉植物（はばたんを除く）                    | アブラムシ類                   | 200～400 倍 |                      |            |       |  |           |  |  |  |
|                                      | カメムシ類、ハマキムシ類、ヨトウムシ類      | 200 倍     |                      |            |       |  |           |  |  |  |

- 2026 年 7 月 8 日付：樹木類（くちなしを除く）といぬまきにコガネムシ類成虫を追加。

- 2024 年 8 月 28 日付：  
 適用作物にうめ、はまなす（果実）、アロニア、きゅうり、すいか、メロン、かぼち  
 ゃ、いちご、ごぼう、葉ごぼう、かぶ、トレビス、にんにく、えだまめ、ほうれんそ  
 う、はこべ、そらまめ、トマト、ミニトマト、なす、ばれいしょ、さといも（葉  
 柄）、食用ゆり、食用亜麻、ごま、しゅんぎく、くちなしを追加。  
 レタス、リーフレタス、豆類(未成熟、ただし、さやえんどう、未成熟そらまめを除  
 く)、樹木類を変更。  
 なし、もも、ネクタリン、かき、キウイフルーツ、かんきつ、いちじく、ハスカッ  
 プ、花き類観葉植物（はぼたんを除く）、はぼたん、樹木類（くちなしを除く）に適  
 用病害虫を追加。
- 2022 年 8 月 30 日付：なばな類、しそ、非結球あぶらな科葉菜類（しろな、みずな、な  
 ばな類を除く）の変更。しろなを非結球はくさいへ統合。
- 2020 年 7 月 8 日付：非結球あぶらな科葉菜類（しろな、みずな、なばな類を除く）の  
 追加、しろな、みずなの変更。
- 2020 年 6 月 18 日付：しろな、みずなの変更。
- 2019 年 5 月 15 日付：キャベツ、ズッキーニ、あずきの変更。
- 2018 年 3 月 28 日付：しその変更。
- 2014 年 1 月 29 日付：茎ブロッコリー、ハスカップの追加、樹木類の変更。