

ベニカケムシエアゾール

有効成分：クロチアニジン…0.032%

フェンプロパトリン…0.020%

農林水産省登録 第 22672 号

※印は本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用害虫名	使用方法	総使用回数※
まさき	ケムシ類、ミノ ウスバ	噴射液が均一に付着するよ うに約 30cm 以上離れた所 から数回断続して噴射する。	本剤：4 回以内 クロチアニジン：6 回以内 フェンプロパトリン：6 回以内
つつじ類	ケムシ類、ツツ ジグンバイ		本剤：4 回以内 クロチアニジン：4 回以内 フェンプロパトリン：6 回以内
くちなし	ケムシ類、オオ スカシバ		
さんごじゅ	ケムシ類、サン ゴジュハムシ		
さるすべり	ケムシ類、アブ ラムシ類		
樹木類(まさき、つつじ 類、くちなし、さんごじ ゅ、さるすべりを除く)	ケムシ類		

※庭木に噴射する場合、一カ所に集中して連続噴射すると植物に影響がでる場合がありますので、局所的な集中噴射は避けてください。

※本剤はジェット噴射のため、約1分50秒で全量噴射されます。

- (2011年5月25日付：さるすべりの追加)