

ベニカ V フレッシュスプレー

有効成分：還元澱粉糖化物…0.60%

クロチアニジン…0.0080%

マンデストロビン…0.020%

農林水産省登録 第 24118 号

※印は収穫物への残留回以内避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と、本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回以内数の制限を示します。

作物名	適用病害虫名	使用時期※	総使用回以内数※		
			本剤	クロチアニジン	マンデストロビン
トマト、ミニトマト	アブラムシ類、コジラミ類、うどんこ病	収穫前日まで	3回以内	4回以内(但し、育苗期の株元処理及び定植時の土壌混和は合計1回以内、散布及び定植後の株元散布は合計3回以内)	3回以内
なす	アブラムシ類、ハダニ類、ハモグリバエ類、テントウムシダマシ類、うどんこ病				
きゅうり	アブラムシ類、コジラミ類、ウリハムシ、うどんこ病				
メロン	アブラムシ類				
すいか	アブラムシ類、うどんこ病				
キャベツ	アオムシ、菌核病	収穫7日前まで	2回以内	3回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内)	
レタス		収穫		5回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は2回以内、定植後の株元散布は2回以内)	
リーフレタス	アブラムシ類				
はくさい	アブラムシ類、アオムシ	3日前まで			

こまつな、しゅんぎく	アブラムシ類				4回以内(但し、は種時の土壌混和は1回以内、散布は3回以内)	
みずな	ダイコンハムシ	収穫 7日前まで				
いんげんまめ	アブラムシ類	収穫 前日まで	3回以内		3回以内	
さやえんどう	アブラムシ類、ハダニ類	収穫				
えだまめ	カメムシ類	3日前まで			4回以内(但し、は種時の処理は1回以内、は種後は3回以内)	
うめ	ケムシ類	収穫 前日まで				
かき	コナカイガラムシ類	収穫 7日前まで				
ぶどう	コナカイガラムシ類、コナメシ類成虫	収穫	3回以内	3回以内		4回以内(但し、休眠期は1回以内、生育期は3回以内)
りんご、なし	ケムシ類、うどんこ病	前日まで				
おうとう	カメムシ類		2回以内	2回以内		
すもも★1		収穫 3日前まで				3回以内
もも、ネクタリン	アブラムシ類	収穫 7日前まで	3回以内	3回以内		

作物名	適用病害虫名	使用時期※	総使用回以内数※		
			本剤	クロチアジソン	マンデーストロピソン
花き類・観葉植物 (ばらを除く)	アブラムシ類	発生初期	4回以内	4回以内	4回以内
ばら	アブラムシ類、チュウレンジハダニ、アザミウマ類、うどんこ病、黒星病				

樹木類 (つつじ類、まさき、さるすべりを除く)	ケムシ類		6回以内	6回以内	6回以内
つつじ類	ケムシ類、ツツジゲソバイ				
まさき、さるすべり	ケムシ類、うどんこ病				

●希釈倍数：原液 ●使用方法：散布 ●還元澱粉糖化物の総使用回以内数※：-

「おうとう」はさくらんぼのことです。 ★1「すもも」にはプラム、プルーン等が含まれます

- 2025年6月19日付：ぶどうの変更