

ST サプロール乳剤

有効成分：トリホリン…18.0%

農林水産省登録 第 22136 号

※印は本剤及びその他の有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量 ★	使用時期	総使用回数※	使用方法	
花き類・観葉植物(ばら、きく、トルコギキョウを除く)	うどんこ病	1,000 倍	100 ～ 300L/10a	発病初期	5 回以内	散布	
ばら	うどんこ病、黒星病						
トルコギキョウ	うどんこ病、斑点病						
きく	白さび病	1,000～1,500 倍					
芝	さび病	1,000 倍	1～2L/m ²	発病初期	6 回以内		
日本芝、西洋芝(ベントグラス)	フェアリーリング病		10L/m ²				
メロン	うどんこ病	2,000 倍	100 ～ 300L/10a	収穫前日まで			
きゅうり、なす		1,000～2,000 倍			5 回以内		
さやえんどう		1,500 倍			3 回以内		
いちご		2,000 倍					
ねぎ	さび病	800 ～ 1,000 倍			5 回以内		
しそ				収穫 3 日前まで	2 回以内		
ピーマン	うどんこ病、斑点病	1,000 倍			収穫前日まで		3 回以内
トマト	うどんこ病、すすかび病、葉かび病						

樹木類	うどんこ病		200 ～	発病初期	5 回以内	
もも	灰星病	800 ～ 1,000 倍	700L/10a	収 穫 前 日 ま で		
食用ぎく	白さび病	1,000 倍	100 ～ 300L/10a	収 穫 14	4 回以内	
かき	うどんこ病		200 ～ 700L/10a	日 前 ま で		

★使用液量の単位の読み替え方：「L/10a」＝「ml/m²」（例 100～300L/10＝100～300ml/m²）

- ・ 2011 年 11 月 9 日付：使用制限変更
- ・ 2018 年 2 月 28 日付：ピーマン、ねぎの変更
- ・ 2019 年 6 月 27 日付：しその追加
- ・ 2023 年 11 月 22 日付：花き類・観葉植物の追加
ばら、きくの変更
- ・ 2024 年 10 月 16 日付：トマト、トルコギキョウ、樹木類の追加。
花き類・観葉植物の変更