

ベニカベジフル乳剤

有効成分：ペルメトリン…3.0%

農林水産省登録 第 23948 号

※印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期※	総使用回数※
トマト	オンシツコナジラミ、アブラムシ類	300～450倍	100～300 mL/m ²	収穫前日まで	3回以内
ミニトマト					本剤：3回以内 ペルメトリン：4回以内（但し、株元散布は1回以内、散布及び噴射は合計3回以内）
きゅうり					オンシツコナジラミ、アブラムシ類、ウリハムシ
ズッキーニ	アブラムシ類、フキノメイガ	300～450倍		収穫7日前まで	本剤：3回以内 ペルメトリン：6回以内（但し、乳剤は3回以内、粒剤は3回以内）
すいか、メロン、かぼちゃ	アブラムシ類	300倍		収穫前日まで	5回以内
なす	アブラムシ類				
	オンシツコナジラミ、テントウムシダマシ類、カメムシ類	3回以内			
ピーマン	アブラムシ類	300～450倍		5回以内	
	タバコガ、カメムシ類	300倍			
とうがらし類	アブラムシ類	300～450倍		収穫7日前まで	2回以内
	タバコガ	300倍			
ばれいしょ	アブラムシ類、テントウムシダマシ類	300～450倍	収穫14日前まで	4回以内	
やまのいも	アブラムシ類、ヤマノイモコガ、アザミウマ類		収穫7日前まで	5回以内	
さといも	ハスモンヨトウ		収穫7日前まで		

	アブラムシ類	450 倍		
さといも(葉柄)	ハスモンヨトウ	300 倍		2 回以内
	アブラムシ類	450 倍		
かんしょ	イモガ			
オクラ	ハスモンヨトウ、アブラムシ類、カメムシ類	300 倍	収穫前日まで	3 回以内
つるむらさき	ヨウムシ			収穫 7 日前まで
食用ゆり	アブラムシ類	450 倍	収穫前日まで	5 回以内
食用亜麻	ヨトウガ	300 倍	収穫 14 日前まで	2 回以内
ごま	アブラムシ類			収穫 3 日前まで
しゅんぎく	アブラムシ類、ハクサイダニ	600 倍	収穫 21 日前まで	2 回以内
とうもろこし	アヲノメガ	300 倍	収穫 14 日前まで	4 回以内
	アブラムシ類	450 倍	収穫前日まで	5 回以内
いちご	アブラムシ類			
ごぼう				
葉ごぼう			収穫 14 日前まで	2 回以内
キャベツ	アオムシ、コナガ、アブラムシ類、ヨトウムシ、タナギソウワバ	300 倍	収穫 3 日前まで	本剤：5 回以内 ペルメリン：5 回以内（但し、株元灌注は 2 回以内）
はくさい	アオムシ、コナガ、アブラムシ類、ヨトウムシ		収穫 7 日前まで	5 回以内
だいこん	アオムシ、コナガ、ヨトウムシ、ハイマダヲノメガ			収穫 30 日前まで
	アブラムシ類	300~450 倍		
茎ブロッコリー	アオムシ	300 倍	収穫 7 日前まで	3 回以内
ブロッコリー、カリフラワー	コナガ			収穫 3 日前まで
	アブラムシ類	300~450 倍		
非結球あぶらな科葉菜類(非	アオムシ	300 倍	収穫前日まで	3 回以内

結球はくさい、みずな、なばな類を除く)					
なばな類	アオムシ、コガ				
みずな	アオムシ				
	アブラムシ類、ダイコンハムシ、ヤサイゾウムシ	450倍			
非結球はくさい	アオムシ	300~600倍			
レタス	アブラムシ類、ヨウムシ	300~450倍		収穫7日前まで	5回以内
リーフレタス				収穫14日前まで	2回以内
トレビス	アブラムシ類	450倍		収穫7日前まで	3回以内
たまねぎ	アザミウマ類、ネギコガ、ハスモンヨトウ				5回以内
ねぎ	アザミウマ類、ネギコガ シロイチモジヨトウ				3回以内
にんにく	アブラムシ類	300倍		収穫前日まで	本剤：2回以内 ペルメトリン：4回以内（但し、乳剤は2回以内、粒剤は2回以内）
アスパラガス	ジュウシホシクビナガハムシ	300~450倍			
	ヨウムシ、アブラムシ類	300倍		収穫14日前まで	
	カメムシ類			収穫7日前まで	
豆類(未成熟、ただし、未成熟そらまめ、さやえんどうを除く)	アザミウマ類、アブラムシ類、ハモグリバエ類、ヨウムシ類、ウラナミジミ、アズキノメイガ、マメシクイガ	450倍		収穫前日まで	
未成熟そらまめ					
さやえんどう	ハモグリバエ、ヨウムシ類、ウラナミジミ			収穫前日まで	
ほうれんそう	アブラムシ類、ウサダイニ			収穫14日前まで	2回以内

だいず	マメシクイガ、ジヤカイモヒゲナガ アブラムシ				
あずき	アズキノメイガ	300倍		収穫7日前まで	3回以内
	アブラムシ類	450倍			
そらまめ					
しそ	ハスモンヨトウ、アブラムシ類、アザミ ウマ類、コナジラミ類、バッタ類	600倍		収穫前日まで	本剤：2回以内 ペルメリン：4回以内(但し、乳剤は 2回以内、粒剤は2回以内)
なし	アブラムシ類、シクイムシ類	300～450倍		収穫前日まで	2回以内
	ハマキムシ類、カメムシ類	300倍			
もも	カメムシ類			収穫7日前まで	6回以内
	シクイムシ類、アブラムシ類	300～450倍			
	モモハエグリガ	300～600倍			
	ハマキムシ類	450倍			
ネクタリン	カメムシ類	300倍		収穫前日まで	3回以内
	シクイムシ類、アブラムシ類	300～450倍			
	モモハエグリガ	300～600倍			
うめ	アブラムシ類	450倍	200～ 700 mL/m ²	収穫前日まで	2回以内
かき	カキノヘタムシガ、チャノキイロアザミウ マ、カメムシ類	300～450倍		収穫7日前まで	5回以内
	カキクダアザミウマ	300倍			
キウイフレー ツ	キイロマイコガ	300～450倍		羽化脱出期 但し収穫14日前 まで	6回以内
	カメムシ類	300倍			
くり	クリタマバチ	150～300倍		収穫14日前まで	6回以内
	クリギゾウムシ	300倍			
かんきつ	ミカンハエグリガ、アブラムシ類	300～600倍		収穫14日前まで	6回以内
	チャノキイロアザミウマ	300～450倍			

	カメムシ類	300 倍			
いちじく	アザミウマ類、アブラムシ類			収穫前日まで	2 回以内
	イチジクヒトリモトキ	450 倍			
はまなす(果実)	シクイムシ類	300 倍		収穫 7 日前まで	
さるなし	キイロマイカ				
アロニア	シクイムシ類	450 倍		収穫 14 日前まで	
ハスカップ	ハマキムシ類、アブラムシ類	300～450 倍		収穫 3 日前まで	
茶	チャノコカクモソハマキ	300 倍	200 ～ 400 mL/m ²	摘採 14 日前まで	1 回
	チャノミドリヒメヨコハ ^イ 、チャノホソガ、チャノキイロアザミウマ	300～450 倍			
花き類・観葉植物(はぼたんを除く)	アブラムシ類	300～600 倍	100 ～ 300 mL/m ²	発生初期	6 回以内
	カメムシ類、ハマキムシ類、ヨウムシ類	300 倍			
はぼたん	アブラムシ類	300～600 倍			
	カメムシ類、ハマキムシ類、ヨウムシ類、アオムシ	300 倍			
樹木類(くちなしを除く)	ケムシ類、アブラムシ類、シャクトリムシ類	600 ～ 1200 倍	200 ～ 700 mL/m ²		
くちなし	ケムシ類、アブラムシ類、シャクトリムシ類				
		アザミウマ類		300 倍	

使用方法：散布

- 2024 年 5 月 29 日付：しその変更。
- 2022 年 8 月 30 日付：なばな類、ミニトマト、しそ、非結球あぶらな科葉菜類（しろな、みずな、なばな類を除く）の変更。しろなを非結球はくさいへ統合。
- 2020 年 7 月 8 日付：非結球あぶらな科葉菜類（しろな、みずな、なばな類を除く）の追加、しろな、みずな、ほうれんそうの変更。
- 2020 年 6 月 18 日付：しろな、みずなの変更。
- 2019 年 11 月 6 日付：てんさいの削除。
- 2019 年 5 月 15 日付：キャベツ、ズッキーニ、にんにくの変更。
- 2018 年 3 月 28 日付：しその変更。